

Document de tableaux de données

Enquête auprès des peuples autochtones de 2006

Un aperçu de la santé de la population métisse : tableaux de données connexes



Division de la statistique sociale et autochtone
Immeuble Jean Talon, 7^e étage, 170 promenade Tunney's Pasture
Ottawa, Ontario K1A 0T6

Comment obtenir d'autres renseignements

Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l'ensemble des données et des services de Statistique Canada, visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel à infostats@statcan.gc.ca ou par téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants :

Centre de contact national de Statistique Canada

Numéros sans frais (Canada et États-Unis) :

Service de renseignements	1-800-263-1136
Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants	1-800-363-7629
Télécopieur	1-877-287-4369
Renseignements concernant le Programme des services de dépôt	1-800-635-7943
Télécopieur pour le Programme des services de dépôt	1-800-565-7757

Appels locaux ou internationaux :

Service de renseignements	1-613-951-8116
Télécopieur	1-613-951-0581

Renseignements pour accéder au produit

Le produit n° 89-637-X n° 005 au catalogue est disponible gratuitement dans des médias substitués. Pour obtenir un exemplaire, il suffit de visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca et de choisir la rubrique « Publications ».

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de service à la clientèle qui sont observées par les employés lorsqu'ils offrent des services à la clientèle. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi publiées sur le site www.statcan.gc.ca sous « À propos de nous » > « Offrir des services aux Canadiens ».

Enquête auprès des peuples autochtones de 2006

Un aperçu de la santé de la population métisse : tableaux de données connexes

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2009

Tous droits réservés. Le contenu de la présente publication électronique peut être reproduit en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, sans autre permission de Statistique Canada, sous réserve que la reproduction soit effectuée uniquement à des fins d'étude privée, de recherche, de critique, de compte rendu ou en vue d'en préparer un résumé destiné aux journaux et/ou à des fins non commerciales. Statistique Canada doit être cité comme suit : Source (ou « Adapté de », s'il y a lieu) : Statistique Canada, année de publication, nom du produit, numéro au catalogue, volume et numéro, période de référence et page(s). Autrement, il est interdit de reproduire le contenu de la présente publication, ou de l'emmagasiner dans un système d'extraction, ou de le transmettre sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, reproduction électronique, mécanique, photographique, pour quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable des Services d'octroi de licences, Division des services à la clientèle, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Mars 2009

N° 89-637-X — N° 005 au catalogue

ISSN 1710-0232

ISBN 978-1-100-90588-4

Périodicité : hors série

Ottawa

This publication is available in English upon request (catalogue no. 89-637-X no. 005).

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

Signes conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada :

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- 0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
- 0^s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie
- ^p provisoire
- ^r révisé
- x confidentiel en vertu des dispositions de la *Loi sur la statistique*
- ^E à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié

Table des matières

Introduction	7
Tableau 1.1 Auto-évaluation de la santé, adultes métis âgés de 15 ans et plus selon le sexe et l'âge, Canada, 2006.....	9
Tableau 1.2 Auto-évaluation de la santé, adultes métis âgés de 15 ans et plus selon le sexe et l'âge, région de l'Atlantique, 2006	10
Tableau 1.3 Auto-évaluation de la santé, adultes métis âgés de 15 ans et plus selon le sexe et l'âge, Québec, 2006.....	11
Tableau 1.4 Auto-évaluation de la santé, adultes métis âgés de 15 ans et plus selon le sexe et l'âge, Ontario, 2006	12
Tableau 1.5 Auto-évaluation de la santé, adultes métis âgés de 15 ans et plus selon le sexe et l'âge, Manitoba, 2006	13
Tableau 1.6 Auto-évaluation de la santé, adultes métis âgés de 15 ans et plus selon le sexe et l'âge, Saskatchewan, 2006	14
Tableau 1.7 Auto-évaluation de la santé, adultes métis âgés de 15 ans et plus selon le sexe et l'âge, Alberta, 2006.....	15
Tableau 1.8 Auto-évaluation de la santé, adultes métis âgés de 15 ans et plus selon le sexe et l'âge, Colombie-Britannique, 2006.....	16
Tableau 1.9 Auto-évaluation de la santé, adultes métis âgés de 15 ans et plus selon le sexe et l'âge, territoires, 2006	17
Tableau 2 Auto-évaluation de la santé, enfants métis âgés de 6 à 14 ans, selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 2006.....	18
Tableau 3.1 Problèmes de santé chroniques : l'arthrite ou les rhumatismes, adultes métis âgés de 15 ans et plus selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 2006.....	19
Tableau 3.2 Problèmes de santé chroniques : l'hypertension, adultes métis âgés de 15 ans et plus selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 2006	20
Tableau 3.3 Problèmes de santé chroniques : le troubles d'estomac ou les ulcères intestinaux, adultes métis âgés de 15 ans et plus selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 2006	21
Tableau 3.4 Problèmes de santé chroniques : l'asthme, adultes métis âgés de 15 ans et plus selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 2006	22
Tableau 3.5 Problèmes de santé chroniques : le diabète, adultes métis âgés de 15 ans et plus selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 2006	23
Tableau 4 Fréquence de la pratique des sports, y compris les leçons, enfants métis âgés de 6 à 14 ans, selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 2006.....	24
Tableau 5.1 Adultes métis âgés de 15 ans et plus ayant un médecin de famille selon le sexe et l'âge, Canada, 2006	25

Tableau 5.2	
Adultes métis âgés de 15 ans et plus ayant un médecin de famille selon le sexe et l'âge, région de l'Atlantique, 2006	26
Tableau 5.3	
Adultes métis âgés de 15 ans et plus ayant un médecin de famille selon le sexe et l'âge, Québec, 2006	27
Tableau 5.4	
Adultes métis âgés de 15 ans et plus ayant un médecin de famille selon le sexe et l'âge, Ontario, 2006.....	28
Tableau 5.5	
Adultes métis âgés de 15 ans et plus ayant un médecin de famille selon le sexe et l'âge, Manitoba, 2006.....	29
Tableau 5.6	
Adultes métis âgés de 15 ans et plus ayant un médecin de famille selon le sexe et l'âge, Saskatchewan, 2006	30
Tableau 5.7	
Adultes métis âgés de 15 ans et plus ayant un médecin de famille selon le sexe et l'âge, Alberta, 2006	31
Tableau 5.8	
Adultes métis âgés de 15 ans et plus ayant un médecin de famille selon le sexe et l'âge, Colombie-Britannique, 2006.....	32
Tableau 5.9	
Adultes métis âgés de 15 ans et plus ayant un médecin de famille selon le sexe et l'âge, territoires, 2006.....	33
Tableau 6	
Contact avec un pédiatre, un omnipraticien ou un médecin de famille au cours des 12 derniers mois, enfants métis âgés de 6 à 14 ans, selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 2006	34
Tableau 7	
Adultes métis âgés de 15 ans et plus n'ayant pas reçu de soins de santé quand ils en avaient besoin, selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 2006	35

Introduction

À propos de l'enquête auprès des peuples autochtones de 2006

L'Enquête auprès des peuples autochtones (EAPA) est une enquête nationale menée auprès des peuples autochtones (membres des Premières nations vivant hors réserve, Métis et Inuits) vivant en milieu urbain, rural et dans les collectivités du Nord, partout au Canada. L'enquête fournit des données cruciales sur les conditions et le mode de vie des enfants et des jeunes autochtones (de 6 à 14 ans) et des adultes autochtones (d'au moins 15 ans).

L'Enquête auprès des peuples autochtones a été menée et mise en oeuvre grâce à la collaboration des organismes autochtones nationaux suivants :

- Le Congrès des Peuples Autochtones (CPA);
- Inuit Tapiriit Kanatami (ITK);
- Le Ralliement national des Métis (RNM);
- L'Association nationale des centres d'amitié (ANCA);
- L'Association des femmes autochtones du Canada (AFAC).

L'enquête a été financée grâce à un consortium de ministères fédéraux, incluant Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC), Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC), Santé Canada (SC), la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et Patrimoine canadien (PC).

L'enquête englobe un large éventail de thèmes, tels que l'identité et l'ascendance autochtones, la scolarité, la langue, l'activité sur le marché du travail, le revenu, la santé, la technologie des communications, la mobilité, le logement et les antécédents familiaux.

Les organismes autochtones, les divers ordres de gouvernement, les fournisseurs de services et les chercheurs pourront utiliser les renseignements fournis par l'Enquête auprès des peuples autochtones (EAPA) aux fins suivantes :

- prendre des décisions éclairées (pour planifier et élaborer des programmes et des politiques) ;
- appuyer la recherche universitaire (les éducateurs et les chercheurs).

L'Enquête auprès des peuples autochtones (EAPA) est une enquête postcensitaire, c'est-à-dire qu'on a choisi parmi les répondants du Recensement de 2006, un échantillon de personnes vivant dans des ménages privés et qui ont répondu dans leur questionnaire par l'affirmative à au moins un des constats suivants :

- ils avaient des ancêtres autochtones;
- ils s'identifiaient avec les Indiens de l'Amérique du Nord, les Métis, les Inuits ou à plusieurs de ces identités;
- ils avaient le statut d'Indien inscrit ou d'Indien visé par un traité;
- ils appartenaient à une bande indienne et/ou à une Première nation.

Cette série de tableaux de données connexes accompagne l'article analytique sur les Métis de l'Enquête auprès des peuples autochtones (EAPA) de 2006. Ces tableaux présentent les données à l'échelon provincial/régional sur la population d'identité autochtone (de 15 ans et plus) pour certains des principaux thèmes abordés dans l'article analytique, notamment : l'état de santé auto-évalué; le pourcentage de personnes ayant reçu un diagnostic d'arthrite ou de rhumatismes, d'hypertension, de problèmes d'estomac ou d'ulcères intestinaux, d'asthme et de diabète; ayant un médecin de famille régulier; et ne recevant pas de soins de santé au besoin. Les thèmes des tableaux de données sur les enfants métis de 6 à 14 ans sont : l'état de santé auto-évalué; la fréquence de la pratique des sports et; la consultation d'un pédiatre, d'un omnipraticien ou d'un médecin de famille au cours des 12 derniers mois.

Pour obtenir plus de détails sur l'enquête, veuillez consulter *L'Enquête auprès des peuples autochtones de 2006 : Guide des concepts et méthodes* (no 89-637-X 2008003 au catalogue).

Les Autochtones vivant dans les établissements indiens et dans les réserves indiennes des 10 provinces n'étaient pas inclus dans l'Enquête auprès des peuples autochtones, 2006.

Il se peut que le total des pourcentages n'équivaille pas à 100 %, puisque les réponses « Ne sait pas », « Refus » et « Non déclaré » ont été prises en compte dans le calcul de l'ensemble des estimations et des arrondissements.

Lorsqu'une question ultérieure est posée pour un sous-groupe défini par une question filtre précédemment posée, la règle suivante est utilisée concernant les données "non déclaré". En utilisant l'approche descendante en matière de traitement, toutes les données "non déclaré" issues de la question filtre sont incluses dans le dénominateur de la question ultérieure. Des pourcentages différents des catégories de la question ultérieure seraient obtenus si les données "non déclaré" n'étaient pas incluses au dénominateur.

Les réponses « Non déclaré » comprennent les réponses « Non déclaré », « Ne sait pas » et « Refus ».

La « région de l'Atlantique » inclut l'ensemble des provinces de l'Atlantique : Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick. Les « territoires » comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

Tableau 1.1
Auto-évaluation de la santé, adultes métis âgés de 15 ans et plus selon le sexe et l'âge,
Canada, 2006

Âge et sexe	Total		Excellente ou très bonne			Bonne			Passable ou faible			Non déclaré		
	nombre	%	Intervalle de confiance à 95 %			Intervalle de confiance à 95 %			Intervalle de confiance à 95 %			Intervalle de confiance à 95 %		
			%	de	à	%	de	à	%	de	à	%	de	à
Les deux sexes	340 440	100	58	57,1	59,8	25	24,3	26,7	16	14,8	16,8	F	F	F
De 15 à 19 ans	43 800	100	75	71,6	77,7	19	16,1	21,9	6	4,7	8,0	x	x	x
De 20 à 24 ans	32 430	100	70	65,9	73,7	24	20,3	27,5	6 ^E	4,4	9,0	x	x	x
De 25 à 34 ans	64 710	100	70	66,9	72,7	23	20,6	26,0	7	5,5	8,5	x	x	x
De 35 à 44 ans	72 160	100	60	56,8	62,6	25	22,3	27,4	15	13,0	17,6	x	x	x
De 45 à 54 ans	66 110	100	50	46,7	52,4	30	27,6	33,0	20	17,9	22,7	x	x	x
De 55 à 64 ans	38 060	100	40	36,3	43,8	30	27,1	34,1	29	26,1	33,0	x	x	x
65 ans et plus	23 170	100	32	27,4	37,2	27	23,2	32,3	39	34,3	44,1	x	x	x
Hommes	160 310	100	59	57,2	61,0	26	24,2	27,7	15	13,5	16,2	x	x	x
De 15 à 19 ans	21 760	100	78	74,2	82,3	17	13,5	21,2	5 ^E	2,8	7,0	x	x	x
De 20 à 24 ans	14 080	100	72	66,1	77,3	23	18,3	28,8	5 ^E	2,7	8,3	x	x	x
De 25 à 34 ans	28 970	100	72	67,6	76,2	22	18,7	26,8	5 ^E	3,7	7,6	x	x	x
De 35 à 44 ans	32 770	100	60	55,3	63,9	25	21,4	29,5	14	11,6	17,9	x	x	x
De 45 à 54 ans	31 550	100	50	46,0	54,3	32	27,8	35,9	18	15,1	21,5	x	x	x
De 55 à 64 ans	19 850	100	39	34,2	44,6	31	26,8	36,3	29	24,7	34,0	x	x	x
65 ans et plus	11 330	100	30	24,6	36,9	31	24,9	37,9	38	31,7	45,2	x	x	x
Femmes	180 130	100	58	56,1	59,8	25	23,5	26,8	17	15,3	18,1	x	x	x
De 15 à 19 ans	22 040	100	71	66,0	75,5	21	16,7	25,4	8 ^E	5,6	10,7	x	x	x
De 20 à 24 ans	18 350	100	68	62,8	73,4	24	19,6	29,3	8 ^E	4,7	11,9	x	x	x
De 25 à 34 ans	35 730	100	68	63,9	72,0	24	20,2	27,7	8	6,2	10,4	x	x	x
De 35 à 44 ans	39 400	100	60	55,6	63,7	24	21,1	28,1	16	12,8	19,2	x	x	x
De 45 à 54 ans	34 560	100	49	45,0	53,0	29	25,4	32,6	22	18,8	25,9	x	x	x
De 55 à 64 ans	18 210	100	41	35,3	46,4	29	24,6	34,9	30	24,8	35,3	x	x	x
65 ans et plus	11 840	100	34	26,8	41,4	24	18,7	30,5	40	32,9	47,4	x	x	x

Nota : La somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 % en raison de l'arrondissement des données.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2006.

Tableau 1.2
Auto-évaluation de la santé, adultes métis âgés de 15 ans et plus selon le sexe et l'âge, région de l'Atlantique, 2006

Âge et sexe	Total		Excellente ou très bonne			Bonne			Passable ou faible			Non déclaré		
	nombre	%	Intervalle de confiance à 95 %		Intervalle de confiance à 95 %		Intervalle de confiance à 95 %		Intervalle de confiance à 95 %		Intervalle de confiance à 95 %			
			%	de	à	%	de	à	%	de	à	%	de	à
Les deux sexes	17 980	100	61	56,5	65,4	24	20,3	28,1	15	11,8	18,7	x	x	x
De 15 à 19 ans	1 750	100	74	59,2	84,3	24 ^E	14,0	38,5	x	x	x	x	x	x
De 20 à 24 ans	1 580	100	84	68,7	92,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
De 25 à 34 ans	2 950	100	69	58,4	78,6	23 ^E	15,1	33,9	x	x	x	x	x	x
De 35 à 44 ans	3 720	100	62	51,6	71,2	27	19,3	36,7	11 ^E	5,9	19,5	x	x	x
De 45 à 54 ans	4 230	100	57	47,1	67,1	25 ^E	16,8	34,7	18 ^E	12,2	25,7	x	x	x
De 55 à 64 ans	2 410	100	44	31,1	57,3	24 ^E	14,8	36,2	32 ^E	20,8	46,4	x	x	x
65 ans et plus	1 350	100	41 ^E	26,5	56,4	F	F	F	36 ^E	22,2	51,8	x	x	x
Hommes	9 050	100	58	51,3	63,7	26	21,1	32,3	16	11,6	21,7	x	x	x
De 15 à 19 ans	1 020 ^E	100	72	51,0	85,6	F	F	F	x	x	x	x	x	x
De 20 à 24 ans	640 ^E	100	61 ^E	36,2	81,4	x	x	x	x	x	x	x	x	x
De 25 à 34 ans	1 150 ^E	100	76	57,8	86,9	x	x	x	x	x	x	x	x	x
De 35 à 44 ans	1 800	100	57	42,6	69,5	31 ^E	19,4	44,3	x	x	x	x	x	x
De 45 à 54 ans	2 380	100	60	45,7	72,8	24 ^E	13,2	38,3	16 ^E	9,5	27,3	x	x	x
De 55 à 64 ans	1 380 ^E	100	38 ^E	23,4	54,2	F	F	F	36 ^E	21,6	53,3	x	x	x
65 ans et plus	680 ^E	100	40 ^E	21,1	61,9	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Femmes	8 930	100	65	58,1	70,5	22	16,8	27,2	14	10,0	18,9	x	x	x
De 15 à 19 ans	730 ^E	100	77	55,3	89,9	x	x	x	x	x	x	x	x	x
De 20 à 24 ans	950 ^E	100	98	88,5	99,8	x	x	x	x	x	x	x	x	x
De 25 à 34 ans	1 800	100	66	51,3	77,9	26 ^E	15,5	41,3	x	x	x	x	x	x
De 35 à 44 ans	1 910	100	67	52,4	78,8	24 ^E	14,5	37,2	x	x	x	x	x	x
De 45 à 54 ans	1 850	100	54	40,9	66,5	26 ^E	16,4	39,1	20 ^E	11,6	31,7	x	x	x
De 55 à 64 ans	1 020 ^E	100	F	F	F	x	x	x	x	x	x	x	x	x
65 ans et plus	680 ^E	100	x	x	x	x	x	x	41 ^E	22,1	63,7	x	x	x

Nota :

La région de l'Atlantique inclut Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. La somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 % en raison de l'arrondissement des données.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2006.

Tableau 1.3
Auto-évaluation de la santé, adultes métis âgés de 15 ans et plus selon le sexe et l'âge, Québec, 2006

Âge et sexe	Total		Excellente ou très bonne			Bonne			Passable ou faible			Non déclaré		
	nombre	%	Intervalle de confiance à 95 %		Intervalle de confiance à 95 %		Intervalle de confiance à 95 %		Intervalle de confiance à 95 %		Intervalle de confiance à 95 %			
			%	de	à	%	de	à	%	de	à	%	de	à
Les deux sexes	32 650	100	58	53,6	62,9	25	21,1	29,7	17	13,3	20,4	x	x	x
De 15 à 19 ans	3 080 ^E	100	67	45,5	82,8	F	F	F	x	x	x	x	x	x
De 20 à 24 ans	1 940	100	80	68,6	88,0	15 ^E	8,1	25,6	x	x	x	x	x	x
De 25 à 34 ans	5 760	100	72	60,7	81,0	26 ^E	16,6	37,0	x	x	x	x	x	x
De 35 à 44 ans	6 620	100	65	54,2	73,7	23 ^E	15,1	32,4	13 ^E	7,5	21,2	x	x	x
De 45 à 54 ans	5 870	100	54	46,0	62,1	24	17,8	32,0	22	15,9	28,8	x	x	x
De 55 à 64 ans	6 140	100	45	33,1	57,2	29 ^E	19,1	40,5	27 ^E	17,2	38,6	x	x	x
65 ans et plus	3 240	100	33 ^E	20,7	48,6	25 ^E	16,5	36,6	42 ^E	26,9	57,9	x	x	x
Hommes	14 930	100	58	50,9	63,9	28	22,2	33,7	15	10,7	20,4	x	x	x
De 15 à 19 ans	1 520 ^E	100	74 ^E	44,6	90,4	x	x	x	x	x	x	x	x	x
De 20 à 24 ans	780 ^E	100	72	52,2	85,9	x	x	x	x	x	x	x	x	x
De 25 à 34 ans	2 880 ^E	100	68	48,8	82,6	F	F	F	x	x	x	x	x	x
De 35 à 44 ans	2 710	100	70	57,3	79,7	23 ^E	13,7	34,5	8 ^E	4,2	14,4	x	x	x
De 45 à 54 ans	2 710	100	51	39,6	61,2	26 ^E	17,5	37,5	23 ^E	15,3	33,8	x	x	x
De 55 à 64 ans	3 040	100	45 ^E	30,6	60,5	30 ^E	19,8	43,5	F	F	F	x	x	x
65 ans et plus	1 290 ^E	100	26 ^E	13,6	42,5	34 ^E	18,9	53,8	F	F	F	x	x	x
Femmes	17 720	100	59	52,2	65,3	23	17,8	29,4	18	13,3	23,8	x	x	x
De 15 à 19 ans	1 560 ^E	100	60 ^E	32,5	82,5	F	F	F	x	x	x	x	x	x
De 20 à 24 ans	1 160 ^E	100	85	70,4	93,4	x	x	x	x	x	x	x	x	x
De 25 à 34 ans	2 880	100	76	65,4	84,0	19 ^E	12,3	29,5	x	x	x	x	x	x
De 35 à 44 ans	3 910	100	61	45,8	74,3	F	F	F	F	F	F	x	x	x
De 45 à 54 ans	3 160	100	57	45,3	68,6	22 ^E	14,1	33,6	20 ^E	12,8	30,6	x	x	x
De 55 à 64 ans	3 100 ^E	100	45 ^E	26,9	63,8	F	F	F	29 ^E	15,5	46,6	x	x	x
65 ans et plus	1 950 ^E	100	F	F	F	19 ^E	10,4	32,9	F	F	F	x	x	x

Nota : La somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 % en raison de l'arrondissement des données.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2006.

Tableau 1.4
Auto-évaluation de la santé, adultes métis âgés de 15 ans et plus selon le sexe et l'âge, Ontario, 2006

Âge et sexe	Total		Excellente ou très bonne			Bonne			Passable ou faible			Non déclaré		
	nombre	%	Intervalle de confiance à 95 %			Intervalle de confiance à 95 %			Intervalle de confiance à 95 %			Intervalle de confiance à 95 %		
			%	de	à	%	de	à	%	de	à	%	de	à
Les deux sexes	70 820	100	58	54,8	61,4	25	22,1	27,6	17	14,5	19,5	x	x	x
De 15 à 19 ans	8 550	100	81	73,3	87,2	13 ^E	7,7	19,9	F	F	F	x	x	x
De 20 à 24 ans	6 260	100	65	54,4	75,1	26 ^E	17,7	37,2	F	F	F	x	x	x
De 25 à 34 ans	11 690	100	68	60,9	74,9	25	18,9	32,3	7 ^E	4,1	10,8	x	x	x
De 35 à 44 ans	15 840	100	60	52,6	67,3	22	17,2	28,7	17 ^E	12,0	24,4	x	x	x
De 45 à 54 ans	16 060	100	49	41,9	55,8	29	22,8	35,7	22	16,7	29,2	x	x	x
De 55 à 64 ans	8 190	100	41	33,4	50,0	33	25,3	41,0	26	19,0	34,3	x	x	x
65 ans et plus	4 230	100	32 ^E	19,5	47,8	24 ^E	15,1	36,0	39 ^E	25,7	53,1	x	x	x
Hommes	35 440	100	60	55,4	64,5	24	20,3	28,2	16	12,6	19,9	x	x	x
De 15 à 19 ans	4 530	100	84	71,8	91,1	x	x	x	x	x	x	x	x	x
De 20 à 24 ans	2 730	100	77	59,5	88,8	x	x	x	x	x	x	x	x	x
De 25 à 34 ans	4 700	100	71	59,4	79,7	25 ^E	16,4	35,9	x	x	x	x	x	x
De 35 à 44 ans	8 560	100	59	49,4	67,8	24 ^E	17,0	33,3	17 ^E	10,7	25,6	x	x	x
De 45 à 54 ans	8 200	100	52	42,0	61,2	31	22,4	40,9	17 ^E	11,1	26,3	x	x	x
De 55 à 64 ans	4 450	100	44	32,7	55,2	27 ^E	17,9	38,6	29 ^E	19,8	41,3	x	x	x
65 ans et plus	2 270 ^E	100	37 ^E	22,1	55,4	25 ^E	13,3	42,1	F	F	F	x	x	x
Femmes	35 380	100	56	51,4	60,8	25	21,8	29,5	18	14,4	21,7	x	x	x
De 15 à 19 ans	4 020	100	78	66,7	87,0	14 ^E	7,4	25,3	x	x	x	x	x	x
De 20 à 24 ans	3 530	100	56	42,4	69,1	33 ^E	21,4	47,8	x	x	x	x	x	x
De 25 à 34 ans	6 990	100	67	56,7	75,5	25 ^E	17,1	35,3	8 ^E	4,6	14,0	x	x	x
De 35 à 44 ans	7 280	100	62	49,8	72,3	20 ^E	13,6	29,5	18 ^E	9,9	30,2	x	x	x
De 45 à 54 ans	7 860	100	46	36,2	55,9	27 ^E	18,9	36,2	27 ^E	19,0	38,0	x	x	x
De 55 à 64 ans	3 740	100	39 ^E	27,2	52,0	39	28,0	52,0	22 ^E	12,9	34,4	x	x	x
65 ans et plus	1 970 ^E	100	x	x	x	23 ^E	11,4	40,5	39 ^E	21,0	61,1	x	x	x

Nota : La somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 % en raison de l'arrondissement des données.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2006.

Tableau 1.5
Auto-évaluation de la santé, adultes métis âgés de 15 ans et plus selon le sexe et l'âge, Manitoba, 2006

Âge et sexe	Total		Excellente ou très bonne			Bonne			Passable ou faible			Non déclaré		
	nombre	%	Intervalle de confiance à 95 %			Intervalle de confiance à 95 %			Intervalle de confiance à 95 %			Intervalle de confiance à 95 %		
			%	de	à	%	de	à	%	de	à	%	de	à
Les deux sexes	54 220	100	60	56,3	63,2	26	22,9	29,2	14	11,7	16,6	x	x	x
De 15 à 19 ans	7 900	100	73	64,9	79,6	20 ^E	13,8	27,1	8 ^E	4,2	13,2	x	x	x
De 20 à 24 ans	4 730	100	73	62,1	81,8	25 ^E	16,5	36,2	x	x	x	x	x	x
De 25 à 34 ans	10 660	100	76	67,6	82,7	17 ^E	11,4	24,0	F	F	F	x	x	x
De 35 à 44 ans	10 750	100	59	50,7	67,2	26	18,9	33,8	14 ^E	9,4	21,4	x	x	x
De 45 à 54 ans	11 320	100	48	40,5	55,7	34	26,5	41,3	18	13,2	25,1	x	x	x
De 55 à 64 ans	5 100	100	45	33,4	57,3	29 ^E	19,1	41,9	25 ^E	16,8	35,6	x	x	x
65 ans et plus	3 750	100	27 ^E	17,7	39,6	40	28,0	53,0	32 ^E	22,2	43,6	x	x	x
Hommes	24 870	100	61	55,5	65,7	27	21,9	31,8	13	9,7	16,2	x	x	x
De 15 à 19 ans	3 620	100	80	68,2	87,8	16 ^E	8,7	27,5	x	x	x	x	x	x
De 20 à 24 ans	1 960 ^E	100	70	53,1	83,2	F	F	F	x	x	x	x	x	x
De 25 à 34 ans	4 930	100	82	70,9	89,2	11 ^E	5,9	19,7	x	x	x	x	x	x
De 35 à 44 ans	4 540	100	60	46,7	72,8	29 ^E	18,3	43,6	x	x	x	x	x	x
De 45 à 54 ans	5 130	100	45	33,7	56,4	38	26,9	50,5	17 ^E	10,6	26,7	x	x	x
De 55 à 64 ans	2 820 ^E	100	46 ^E	29,3	64,0	F	F	F	24 ^E	13,4	40,1	x	x	x
65 ans et plus	1 870 ^E	100	F	F	F	48 ^E	31,3	64,7	28 ^E	16,4	43,0	x	x	x
Femmes	29 350	100	59	54,3	63,6	25	21,5	29,8	15	12,0	18,9	x	x	x
De 15 à 19 ans	4 280	100	67	55,1	77,1	23 ^E	14,4	33,6	F	F	F	x	x	x
De 20 à 24 ans	2 770	100	75	60,7	85,4	25 ^E	14,1	38,8	x	x	x	x	x	x
De 25 à 34 ans	5 730	100	71	58,9	80,5	22 ^E	13,5	32,9	F	F	F	x	x	x
De 35 à 44 ans	6 220	100	58	47,5	68,3	23 ^E	15,3	33,1	18 ^E	10,8	27,0	x	x	x
De 45 à 54 ans	6 190	100	51	40,8	60,6	30	21,4	39,8	20 ^E	12,2	29,6	x	x	x
De 55 à 64 ans	2 290	100	44 ^E	29,5	59,1	31 ^E	17,7	47,1	26 ^E	15,3	40,1	x	x	x
65 ans et plus	1 880 ^E	100	30 ^E	16,5	48,3	F	F	F	36 ^E	21,4	54,1	x	x	x

Nota : La somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 % en raison de l'arrondissement des données.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2006.

Tableau 1.6
Auto-évaluation de la santé, adultes métis âgés de 15 ans et plus selon le sexe et l'âge, Saskatchewan, 2006

Âge et sexe	Total		Excellente ou très bonne			Bonne			Passable ou faible			Non déclaré		
	nombre	%	Intervalle de confiance à 95 %		Intervalle de confiance à 95 %		Intervalle de confiance à 95 %		Intervalle de confiance à 95 %		Intervalle de confiance à 95 %			
			%	de	à	%	de	à	%	de	à	%	de	à
Les deux sexes	36 400	100	56	52,7	58,5	27	24,1	29,2	18	15,6	19,9	x	x	x
De 15 à 19 ans	5 870	100	74	67,8	80,1	20	14,6	25,9	5 ^E	2,8	8,5	x	x	x
De 20 à 24 ans	4 220	100	68	60,3	75,4	27	20,5	35,2	x	x	x	x	x	x
De 25 à 34 ans	8 010	100	66	60,2	71,4	23	18,4	28,5	11 ^E	7,4	15,1	x	x	x
De 35 à 44 ans	6 760	100	54	46,7	60,5	28	22,1	34,9	18	13,0	24,2	x	x	x
De 45 à 54 ans	6 150	100	39	33,2	45,8	35	28,9	41,5	26	20,2	32,1	x	x	x
De 55 à 64 ans	3 140	100	31	23,3	40,4	30	21,8	39,1	39	30,0	49,0	x	x	x
65 ans et plus	2 250	100	30 ^E	20,4	41,1	23 ^E	14,8	34,6	47	35,9	58,5	x	x	x
Hommes	17 070	100	59	54,7	62,9	24	21,0	28,2	17	13,7	20,0	x	x	x
De 15 à 19 ans	2 920	100	80	71,9	86,4	16 ^E	10,2	23,7	x	x	x	x	x	x
De 20 à 24 ans	1 890	100	72	59,1	81,9	22 ^E	12,8	34,5	x	x	x	x	x	x
De 25 à 34 ans	3 680	100	68	59,6	75,7	22	15,9	30,1	10 ^E	5,4	16,4	x	x	x
De 35 à 44 ans	3 080	100	57	46,3	67,0	27 ^E	19,3	37,3	15 ^E	8,5	25,4	x	x	x
De 45 à 54 ans	2 610	100	42	32,3	52,3	32	23,4	41,9	26 ^E	17,9	36,3	x	x	x
De 55 à 64 ans	1 840	100	35 ^E	24,7	48,2	32 ^E	21,2	44,3	33 ^E	22,3	45,4	x	x	x
65 ans et plus	1 050 ^E	100	32 ^E	19,1	49,2	x	x	x	47 ^E	31,1	62,9	x	x	x
Femmes	19 330	100	53	48,7	56,6	28	25,0	32,1	19	15,7	21,7	x	x	x
De 15 à 19 ans	2 960	100	69	58,7	77,4	23 ^E	16,0	32,9	x	x	x	x	x	x
De 20 à 24 ans	2 320	100	66	55,2	74,4	32	23,0	41,9	x	x	x	x	x	x
De 25 à 34 ans	4 320	100	64	55,7	71,8	24	17,3	32,0	12 ^E	7,2	18,0	x	x	x
De 35 à 44 ans	3 680	100	51	41,7	60,2	29	20,6	38,5	20 ^E	13,7	29,1	x	x	x
De 45 à 54 ans	3 550	100	37	29,8	45,7	37	29,4	45,7	25	18,7	33,5	x	x	x
De 55 à 64 ans	18 210	100	25 ^E	15,1	38,4	27 ^E	16,6	40,8	48	33,8	62,4	x	x	x
65 ans et plus	1 190	100	28 ^E	16,0	42,8	25 ^E	14,1	41,0	48	32,8	62,5	x	x	x

Nota : La somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 % en raison de l'arrondissement des données.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2006.

Tableau 1.7
Auto-évaluation de la santé, adultes métis âgés de 15 ans et plus selon le sexe et l'âge, Alberta, 2006

Âge et sexe	Total		Excellente ou très bonne			Bonne			Passable ou faible			Non déclaré		
	nombre	%	Intervalle de confiance à 95 %			Intervalle de confiance à 95 %			Intervalle de confiance à 95 %			Intervalle de confiance à 95 %		
			%	de	à	%	de	à	%	de	à	%	de	à
Les deux sexes	73 100	100	61	58,2	63,4	24	21,7	26,4	15	13,1	16,9	x	x	x
De 15 à 19 ans	9 610	100	81	75,1	85,3	15	10,6	20,1	5 ^E	2,5	8,2	x	x	x
De 20 à 24 ans	8 030	100	74	66,3	79,8	20	14,5	27,0	6 ^E	3,5	11,2	x	x	x
De 25 à 34 ans	16 070	100	68	61,6	73,6	25	19,5	31,3	7 ^E	4,4	10,9	x	x	x
De 35 à 44 ans	16 420	100	61	55,0	66,1	24	19,3	29,0	14	10,9	18,9	x	x	x
De 45 à 54 ans	11 200	100	55	48,8	61,4	28	22,2	33,5	17	13,1	22,7	x	x	x
De 55 à 64 ans	7 380	100	33	26,3	40,7	36	28,6	44,0	31	24,1	38,7	x	x	x
65 ans et plus	4 390	100	30 ^E	20,4	41,4	19 ^E	11,6	29,1	50	39,1	61,8	x	x	x
Hommes	33 950	100	61	57,1	64,7	25	21,2	28,2	14	11,5	16,5	x	x	x
De 15 à 19 ans	4 840	100	80	71,7	86,7	15 ^E	9,2	23,0	x	x	x	x	x	x
De 20 à 24 ans	3 770	100	77	66,2	84,7	20 ^E	12,2	30,2	x	x	x	x	x	x
De 25 à 34 ans	7 340	100	69	59,5	77,3	26 ^E	18,5	35,6	x	x	x	x	x	x
De 35 à 44 ans	6 870	100	59	50,6	67,5	24 ^E	16,8	32,3	15 ^E	9,7	21,4	x	x	x
De 45 à 54 ans	5 710	100	58	49,2	66,8	27	19,2	35,6	15 ^E	9,8	22,6	x	x	x
De 55 à 64 ans	3 320	100	24 ^E	15,9	35,0	43	31,3	55,3	33 ^E	22,8	44,9	x	x	x
65 ans et plus	2 110	100	31 ^E	18,0	48,0	x	x	x	49 ^E	33,4	64,4	x	x	x
Femmes	39 150	100	61	57,2	64,2	23	20,4	26,7	16	13,3	18,8	x	x	x
De 15 à 19 ans	4 770	100	81	72,5	87,6	15 ^E	9,1	22,7	x	x	x	x	x	x
De 20 à 24 ans	4 260	100	71	60,1	79,7	20 ^E	12,9	30,5	x	x	x	x	x	x
De 25 à 34 ans	8 730	100	67	58,2	74,5	24 ^E	17,0	32,6	9 ^E	5,3	15,6	x	x	x
De 35 à 44 ans	9 560	100	62	54,3	68,6	24	18,2	30,8	14 ^E	9,6	20,8	x	x	x
De 45 à 54 ans	5 490	100	52	43,1	60,6	28	21,2	37,0	20 ^E	13,4	27,9	x	x	x
De 55 à 64 ans	4 060	100	40	30,5	51,3	30	21,6	40,5	29 ^E	20,6	39,9	x	x	x
65 ans et plus	2 270	100	29 ^E	16,4	45,2	19 ^E	10,8	32,1	52	36,3	67,4	x	x	x

Nota : La somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 % en raison de l'arrondissement des données.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2006.

Tableau 1.8
Auto-évaluation de la santé, adultes métis âgés de 15 ans et plus selon le sexe et l'âge,
Colombie-Britannique, 2006

Âge et sexe	Total		Excellente ou très bonne			Bonne			Passable ou faible			Non déclaré		
	nombre	%	Intervalle de confiance à 95 %			Intervalle de confiance à 95 %			Intervalle de confiance à 95 %			Intervalle de confiance à 95 %		
			%	de	à	%	de	à	%	de	à	%	de	à
Les deux sexes	51 590	100	56	52,1	59,3	28	24,7	31,4	16	13,8	18,8	x	x	x
De 15 à 19 ans	6 440	100	65	55,6	72,6	23 ^E	16,4	31,9	11 ^E	7,0	17,9	x	x	x
De 20 à 24 ans	5 180	100	61	48,5	71,6	28 ^E	18,7	38,9	x	x	x	x	x	x
De 25 à 34 ans	8 960	100	71	62,7	77,6	24	17,5	31,9	5 ^E	2,9	9,6	x	x	x
De 35 à 44 ans	11 300	100	58	50,3	65,1	26	19,8	34,3	16 ^E	11,1	21,8	x	x	x
De 45 à 54 ans	10 650	100	47	39,6	53,6	34	27,6	41,6	19	14,3	24,9	x	x	x
De 55 à 64 ans	5 340	100	41	31,8	51,1	26	18,8	34,4	33	24,1	42,4	x	x	x
65 ans et plus	3 720	100	38	27,4	50,7	36 ^E	24,2	49,2	26 ^E	16,9	37,6	x	x	x
Hommes	23 200	100	55	49,7	60,4	29	24,6	34,9	15	12,1	19,0	x	x	x
De 15 à 19 ans	3 090	100	70	56,4	81,2	24 ^E	14,2	38,1	x	x	x	x	x	x
De 20 à 24 ans	1 990 ^E	100	62	44,4	77,0	33 ^E	19,1	49,9	x	x	x	x	x	x
De 25 à 34 ans	4 000	100	73	60,6	82,9	22 ^E	12,9	33,9	x	x	x	x	x	x
De 35 à 44 ans	4 890	100	58	45,2	70,1	F	F	F	18 ^E	10,9	29,7	x	x	x
De 45 à 54 ans	4 490	100	42	32,1	52,8	40	29,8	51,5	17 ^E	10,8	26,5	x	x	x
De 55 à 64 ans	2 800	100	42 ^E	28,4	56,4	30 ^E	20,0	43,5	27 ^E	17,0	40,1	x	x	x
65 ans et plus	1 940	100	28 ^E	16,8	44,2	40 ^E	25,0	56,8	31 ^E	19,7	46,5	x	x	x
Femmes	28 390	100	56	51,4	60,9	27	22,7	31,2	17	13,6	20,7	x	x	x
De 15 à 19 ans	3 350	100	59	47,3	70,2	22 ^E	13,7	34,3	17 ^E	9,7	27,2	x	x	x
De 20 à 24 ans	3 180	100	60	43,5	74,1	25 ^E	14,0	39,3	x	x	x	x	x	x
De 25 à 34 ans	4 970	100	69	57,6	78,0	26 ^E	17,3	36,8	x	x	x	x	x	x
De 35 à 44 ans	6 410	100	58	48,4	66,4	29	20,9	38,1	14 ^E	8,5	21,1	x	x	x
De 45 à 54 ans	6 160	100	50	40,5	59,1	30	21,8	39,4	20 ^E	13,9	28,7	x	x	x
De 55 à 64 ans	2 540	100	41 ^E	28,0	54,2	21 ^E	12,1	33,4	39 ^E	25,9	53,3	x	x	x
65 ans et plus	1 780 ^E	100	49 ^E	30,6	67,7	F	F	F	x	x	x	x	x	x

Nota : La somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 % en raison de l'arrondissement des données.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2006.

Tableau 1.9
Auto-évaluation de la santé, adultes métis âgés de 15 ans et plus selon le sexe et l'âge, territoires, 2006

Âge et sexe	Total		Excellente ou très bonne			Bonne			Passable ou faible			Non déclaré		
	nombre	%	Intervalle de confiance à 95 %			Intervalle de confiance à 95 %			Intervalle de confiance à 95 %			Intervalle de confiance à 95 %		
			%	de	à	%	de	à	%	de	à	%	de	à
Les deux sexes	3 680	100	57	50,4	62,3	30	24,2	35,4	14	10,4	18,6	x	x	x
De 15 à 19 ans	590 ^E	100	68	48,2	81,7	F	F	F	x	x	x	x	x	x
De 20 à 24 ans	490 ^E	100	67	47,5	81,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
De 25 à 34 ans	610	100	72	57,1	83,8	F	F	F	x	x	x	x	x	x
De 35 à 44 ans	750	100	61	48,0	73,8	36 ^E	24,0	49,6	x	x	x	x	x	x
De 45 à 54 ans	620	100	50	37,7	63,2	34 ^E	22,7	46,8	16 ^E	9,0	26,1	x	x	x
De 55 à 64 ans	370	100	27 ^E	15,9	41,7	35 ^E	22,4	51,0	38 ^E	22,9	55,2	x	x	x
65 ans et plus	250 ^E	100	x	x	x	x	x	x	68	46,5	83,4	x	x	x
Hommes	1 800	100	57	48,5	65,0	29	22,0	37,1	14^E	9,3	20,9	x	x	x
De 15 à 19 ans	220 ^E	100	77	51,6	91,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x
De 20 à 24 ans	320 ^E	100	69 ^E	43,4	85,6	x	x	x	x	x	x	x	x	x
De 25 à 34 ans	290 ^E	100	72	48,5	89,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
De 35 à 44 ans	320 ^E	100	63	43,9	75,4	34 ^E	19,8	50,4	x	x	x	x	x	x
De 45 à 54 ans	320 ^E	100	59	39,5	74,8	x	x	x	x	x	x	x	x	x
De 55 à 64 ans	210 ^E	100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
65 ans et plus	120 ^E	100	x	x	x	x	x	x	F	F	F	x	x	x
Femmes	1 880	100	56	47,4	64,2	30	22,5	38,9	14^E	9,1	20,9	x	x	x
De 15 à 19 ans	370 ^E	100	62 ^E	37,2	81,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
De 20 à 24 ans	180 ^E	100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
De 25 à 34 ans	320 ^E	100	72	51,8	85,6	x	x	x	x	x	x	x	x	x
De 35 à 44 ans	430 ^E	100	63	42,3	79,0	F	F	F	x	x	x	x	x	x
De 45 à 54 ans	300 ^E	100	43 ^E	26,8	59,3	40 ^E	24,1	56,8	x	x	x	x	x	x
De 55 à 64 ans	160 ^E	100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
65 ans et plus	F	100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Nota :

Les territoires incluent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

La somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 % en raison de l'arrondissement des données.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2006.

Tableau 2
Auto-évaluation de la santé, enfants métis âgés de 6 à 14 ans, selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 2006

Région et sexe	Total		Excellente ou très bonne			Bonne			Passable ou faible			Non déclaré		
	nombre	%	Intervalle de confiance à 95 %			Intervalle de confiance à 95 %			Intervalle de confiance à 95 %			Intervalle de confiance à 95 %		
			%	de	à	%	de	à	%	de	à	%	de	à
Canada														
Les deux sexes	73 670	100	84	82,8	85,1	13	11,7	13,8	3	2,7	3,8	x	x	x
Garçons	36 940	100	83	81,8	85,0	13	11,7	14,5	3	2,7	4,2	x	x	x
Filles	36 730	100	85	82,8	86,1	12	10,9	13,9	3	2,4	4,0	x	x	x
Région de l'Atlantique														
Les deux sexes	3 190	100	90	86,0	92,7	8 ^E	5,8	11,9	x	x	x	x	x	x
Garçons	1 610	100	90	84,9	93,4	9 ^E	5,4	13,3	x	x	x	x	x	x
Filles	1 580	100	90	83,5	93,8	8 ^E	4,7	13,9	x	x	x	x	x	x
Québec														
Les deux sexes	4 880	100	87	82,6	90,2	10 ^E	7,6	14,6	x	x	x	x	x	x
Garçons	2 390	100	90	83,9	93,9	8 ^E	4,3	13,7	x	x	x	x	x	x
Filles	2 480	100	84	77,2	88,9	13 ^E	8,8	19,4	x	x	x	x	x	x
Ontario														
Les deux sexes	13 000	100	87	84,4	89,6	10	8,1	12,8	3 ^E	1,6	4,1	x	x	x
Garçons	6 150	100	85	80,4	88,8	12 ^E	8,6	16,4	3 ^E	1,6	5,5	x	x	x
Filles	6 850	100	89	85,6	92,0	9 ^E	6,2	11,9	x	x	x	x	x	x
Manitoba														
Les deux sexes	12 970	100	83	79,2	85,5	14	11,1	16,7	4 ^E	2,3	5,9	x	x	x
Garçons	6 660	100	82	78,0	86,0	14	10,8	17,6	4 ^E	2,1	6,9	x	x	x
Filles	6 310	100	83	77,4	87,2	13	9,7	18,3	F	F	F	x	x	x
Saskatchewan														
Les deux sexes	9 550	100	82	79,2	84,2	15	12,8	17,4	3 ^E	2,2	4,4	x	x	x
Garçons	5 010	100	80	76,1	83,2	17	13,6	20,1	3 ^E	2,1	5,4	x	x	x
Filles	4 540	100	84	80,0	87,3	13	10,0	17,0	3 ^E	1,6	4,6	x	x	x
Alberta														
Les deux sexes	16 700	100	84	81,1	86,2	13	10,5	15,2	3 ^E	2,5	4,7	x	x	x
Garçons	8 470	100	84	79,9	87,2	12	9,2	16,1	4 ^E	2,5	5,7	x	x	x
Filles	8 240	100	84	80,2	86,9	13	10,3	16,5	3 ^E	1,8	4,9	x	x	x
Colombie-Britannique														
Les deux sexes	12 450	100	81	77,7	83,7	15	12,4	17,8	4 ^E	2,8	5,7	x	x	x
Garçons	6 180	100	81	76,8	84,6	15	12,0	19,2	3 ^E	2,0	5,8	x	x	x
Filles	6 270	100	81	75,9	84,9	15	11,0	19,1	5 ^E	2,8	7,5	x	x	x
Territoires														
Les deux sexes	930	100	90	84,0	94,4	F	F	F	x	x	x	x	x	x
Garçons	470	100	87	78,8	94,4	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Filles	460	100	91	82,2	96,6	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Nota :

La région de l'Atlantique inclut Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.

Les territoires incluent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

La somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 % en raison de l'arrondissement des données.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2006.

Tableau 3.1
Problèmes de santé chroniques : l'arthrite ou les rhumatismes, adultes métis âgés de 15 ans et plus selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 2006

Région et sexe	Total		Oui			Non			Non déclaré		
	nombre	%	Intervalle de confiance à 95 %		%	Intervalle de confiance à 95 %		%	Intervalle de confiance à 95 %		
			de	à		de	à		de	à	
Canada											
Les deux sexes	340 440	100	21	20,1	22,3	78	77,2	79,5	0 ^E	0,3	0,8
Hommes	160 310	100	18	16,7	19,6	81	79,6	82,6	1 ^E	0,4	1,2
Femmes	180 130	100	24	22,2	25,5	76	74,2	77,5	F	F	F
Région de l'Atlantique											
Les deux sexes	17 980	100	24	20,3	27,8	76	71,8	79,4	x	x	x
Hommes	9 050	100	21	16,3	26,6	78	72,4	83,1	x	x	x
Femmes	8 930	100	27	21,5	32,6	73	67,4	78,5	x	x	x
Québec											
Les deux sexes	32 650	100	18	14,5	22,1	82	77,4	85,0	x	x	x
Hommes	14 930	100	14	10,1	18,6	85	80,0	89,0	x	x	x
Femmes	17 720	100	21	15,9	28,3	79	71,7	84,1	x	x	x
Ontario											
Les deux sexes	70 820	100	24	21,7	27,3	75	72,3	77,9	x	x	x
Hommes	35 440	100	22	18,7	26,0	77	73,4	80,8	x	x	x
Femmes	35 380	100	27	22,7	31,1	73	68,6	77,1	x	x	x
Manitoba											
Les deux sexes	54 220	100	21	18,1	23,9	79	75,6	81,6	x	x	x
Hommes	24 870	100	17	13,9	21,8	82	77,1	85,4	x	x	x
Femmes	29 350	100	24	19,7	28,2	76	71,8	80,3	x	x	x
Saskatchewan											
Les deux sexes	36 400	100	20	17,6	22,3	79	76,8	81,7	x	x	x
Hommes	17 070	100	16	13,5	19,9	83	79,3	85,8	x	x	x
Femmes	19 330	100	23	19,7	26,3	76	72,7	79,5	x	x	x
Alberta											
Les deux sexes	73 100	100	20	17,6	22,1	80	77,2	81,8	x	x	x
Hommes	33 950	100	17	14,5	20,6	82	78,5	84,9	x	x	x
Femmes	39 150	100	22	18,9	25,2	78	74,3	80,6	x	x	x
Colombie-Britannique											
Les deux sexes	51 590	100	22	18,9	24,5	78	75,2	80,7	x	x	x
Hommes	23 200	100	17	13,7	21,6	82	78,0	85,9	x	x	x
Femmes	28 390	100	25	21,3	29,3	75	70,4	78,4	x	x	x
Territoires											
Les deux sexes	3 680	100	11	8,5	15,2	89	84,8	91,5	x	x	x
Hommes	1 800	100	8 ^E	5,2	13,7	91	86,3	94,8	x	x	x
Femmes	1 880	100	14 ^E	9,6	20,5	86	79,5	90,4	x	x	x

Nota :

La région de l'Atlantique inclut Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.

Les territoires incluent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

Les données sont basées sur la question suivante : « Les prochaines questions portent sur des problèmes de santé prolongés que vous pouvez éprouver à présent. Des problèmes de santé prolongés sont des problèmes qui durent depuis 6 mois ou plus ou qui risquent de perdurer pendant 6 mois ou plus. Est-ce qu'un médecin, une infirmière ou un autre professionnel de la santé a confirmé que vous souffriez de. »

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2006.

Tableau 3.2
Problèmes de santé chroniques : l'hypertension, adultes métis âgés de 15 ans et plus selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 2006

Région et sexe	Total		Oui			Non			Non déclaré		
	nombre	%	Intervalle de confiance à 95 %		%	Intervalle de confiance à 95 %		%	Intervalle de confiance à 95 %		
			de	à		de	à		de	à	
Canada											
Les deux sexes	340 440	100	16	15,0	17,0	83	82,4	84,4	1^E	0,4	0,9
Hommes	160 310	100	17	15,4	18,2	82	81,0	83,9	1 ^E	0,5	1,3
Femmes	180 130	100	15	14,0	16,7	84	82,9	85,5	0 ^E	0,2	0,7
Région de l'Atlantique											
Les deux sexes	17 980	100	21	17,7	25,2	78	74,2	81,8	x	x	x
Hommes	9 050	100	21	16,7	27,2	78	72,0	82,6	x	x	x
Femmes	8 930	100	21	15,9	27,1	79	72,5	83,7	x	x	x
Québec											
Les deux sexes	32 650	100	16	13,0	19,7	83	79,5	86,2	F	F	F
Hommes	14 930	100	12	9,1	16,1	87	82,6	89,8	x	x	x
Femmes	17 720	100	19	14,7	25,2	80	74,4	84,9	x	x	x
Ontario											
Les deux sexes	70 820	100	18	15,4	20,5	82	78,9	84,1	x	x	x
Hommes	35 440	100	21	17,1	24,8	79	74,4	82,2	x	x	x
Femmes	35 380	100	15	11,9	18,6	85	81,0	87,8	x	x	x
Manitoba											
Les deux sexes	54 220	100	14	11,7	16,4	86	83,2	88,0	x	x	x
Hommes	24 870	100	14	11,3	18,5	85	80,6	88,1	x	x	x
Femmes	29 350	100	13	10,5	16,7	87	83,3	89,5	x	x	x
Saskatchewan											
Les deux sexes	36 400	100	15	13,3	17,3	84	81,6	85,9	x	x	x
Hommes	17 070	100	15	12,5	18,3	84	80,9	86,9	x	x	x
Femmes	19 330	100	15	12,6	18,2	84	80,6	86,5	x	x	x
Alberta											
Les deux sexes	73 100	100	16	13,7	17,5	84	81,8	85,6	x	x	x
Hommes	33 950	100	16	13,6	19,1	83	80,2	85,8	x	x	x
Femmes	39 150	100	15	12,6	17,8	84	81,5	86,8	x	x	x
Colombie-Britannique											
Les deux sexes	51 590	100	15	13,0	17,8	84	81,7	86,6	x	x	x
Hommes	23 200	100	16	13,0	20,2	83	79,1	86,4	x	x	x
Femmes	28 390	100	14	11,5	17,9	85	81,7	88,2	x	x	x
Territoires											
Les deux sexes	3 680	100	14	10,4	17,7	86	81,6	89,1	x	x	x
Hommes	1 800	100	17 ^E	11,9	24,5	81	74,1	87,1	x	x	x
Femmes	1 880	100	10 ^E	6,9	14,9	90	85,1	93,1	x	x	x

Nota :

La région de l'Atlantique inclut Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.

Les territoires incluent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

Les données sont basées sur la question suivante : « Les prochaines questions portent sur des problèmes de santé prolongés que vous pouvez éprouver à présent. Des problèmes de santé prolongés sont des problèmes qui durent depuis 6 mois ou plus ou qui risquent de perdurer pendant 6 mois ou plus. Est-ce qu'un médecin, une infirmière ou un autre professionnel de la santé a confirmé que vous souffriez de. »

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2006.

Tableau 3.3
Problèmes de santé chroniques : le troubles d'estomac ou les ulcères intestinaux, adultes métis âgés de 15 ans et plus selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 2006

Région et sexe	Total		Oui			Non			Non déclaré		
	nombre	%	Intervalle de confiance à 95 %		%	Intervalle de confiance à 95 %		%	Intervalle de confiance à 95 %		
			de	à		de	à		de	à	
Canada											
Les deux sexes	340 440	100	12	11,2	12,9	87	86,4	88,1	1^E	0,5	1,0
Hommes	160 310	100	11	9,4	11,7	88	87,2	89,7	1 ^E	0,7	1,6
Femmes	180 130	100	13	12,2	14,6	86	84,9	87,4	0 ^E	0,2	0,7
Région de l'Atlantique											
Les deux sexes	17 980	100	13	9,6	16,1	87	82,8	89,8	x	x	x
Hommes	9 050	100	11 ^E	7,4	15,7	88	82,0	91,5	x	x	x
Femmes	8 930	100	14 ^E	10,1	19,6	86	80,4	89,9	x	x	x
Québec											
Les deux sexes	32 650	100	11	8,6	14,0	88	85,0	90,6	x	x	x
Hommes	14 930	100	12	8,3	15,8	87	82,1	90,1	x	x	x
Femmes	17 720	100	11 ^E	7,4	15,1	89	84,9	92,6	x	x	x
Ontario											
Les deux sexes	70 820	100	13	10,7	15,3	87	84,2	88,8	x	x	x
Hommes	35 440	100	11	8,5	14,6	88	84,6	90,8	x	x	x
Femmes	35 380	100	14	11,4	18,1	85	81,7	88,3	x	x	x
Manitoba											
Les deux sexes	54 220	100	12	9,7	14,1	88	85,4	90,1	x	x	x
Hommes	24 870	100	10	7,5	13,4	89	85,4	92,1	x	x	x
Femmes	29 350	100	13	10,2	16,6	87	83,4	89,8	x	x	x
Saskatchewan											
Les deux sexes	36 400	100	14	11,8	15,6	85	83,0	87,1	1^E	0,7	2,3
Hommes	17 070	100	13	10,5	16,3	86	82,2	88,3	x	x	x
Femmes	19 330	100	14	11,5	16,8	85	81,9	87,5	x	x	x
Alberta											
Les deux sexes	73 100	100	11	9,7	13,2	88	85,9	89,5	1^E	0,5	1,7
Hommes	33 950	100	8	6,4	10,6	91	88,4	92,8	x	x	x
Femmes	39 150	100	14	11,5	16,8	85	82,2	87,7	x	x	x
Colombie-Britannique											
Les deux sexes	51 590	100	12	9,8	14,2	88	85,2	89,7	x	x	x
Hommes	23 200	100	11	8,0	14,0	89	85,1	91,4	x	x	x
Femmes	28 390	100	13	10,1	16,3	87	83,4	89,6	x	x	x
Territoires											
Les deux sexes	3 680	100	10^E	6,6	13,6	90	86,1	93,2	x	x	x
Hommes	1 800	100	11 ^E	6,2	17,1	89	82,2	93,4	x	x	x
Femmes	1 880	100	9 ^E	5,2	14,1	91	85,9	94,8	x	x	x

Nota :

La région de l'Atlantique inclut Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.

Les territoires incluent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

Les données sont basées sur la question suivante : « Les prochaines questions portent sur des problèmes de santé prolongés que vous pouvez éprouver à présent. Des problèmes de santé prolongés sont des problèmes qui durent depuis 6 mois ou plus ou qui risquent de perdurer pendant 6 mois ou plus. Est-ce qu'un médecin, une infirmière ou un autre professionnel de la santé a confirmé que vous souffriez de. »

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2006.

Tableau 3.4
Problèmes de santé chroniques : l'asthme, adultes métis âgés de 15 ans et plus selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 2006

Région et sexe	Total		Oui			Non			Non déclaré		
	nombre	%	Intervalle de confiance à 95 %		%	Intervalle de confiance à 95 %		%	Intervalle de confiance à 95 %		
			de	à		de	à		de	à	
Canada											
Les deux sexes	340 440	100	14	13,2	15,2	85	84,2	86,2	1^E	0,4	0,9
Hommes	160 310	100	11	10,2	12,8	88	86,4	89,0	1 ^E	0,5	1,3
Femmes	180 130	100	17	15,2	18,1	83	81,4	84,4	0 ^E	0,2	0,7
Région de l'Atlantique											
Les deux sexes	17 980	100	12	9,3	15,6	87	83,4	90,0	x	x	x
Hommes	9 050	100	10 ^E	6,2	14,8	89	83,4	93,0	x	x	x
Femmes	8 930	100	15	10,5	19,8	85	79,7	89,1	x	x	x
Québec											
Les deux sexes	32 650	100	18	14,0	22,2	82	77,1	85,4	x	x	x
Hommes	14 930	100	12 ^E	8,1	16,9	87	81,7	90,8	x	x	x
Femmes	17 720	100	23	16,9	29,9	77	70,1	83,0	x	x	x
Ontario											
Les deux sexes	70 820	100	17	14,2	19,2	83	80,2	85,3	x	x	x
Hommes	35 440	100	12	9,5	16,2	87	82,9	89,9	x	x	x
Femmes	35 380	100	21	17,2	24,5	79	75,1	82,5	x	x	x
Manitoba											
Les deux sexes	54 220	100	14	11,7	16,7	86	82,9	88,0	x	x	x
Hommes	24 870	100	12	9,5	16,1	87	82,8	90,0	x	x	x
Femmes	29 350	100	15	12,1	19,3	85	80,7	87,9	x	x	x
Saskatchewan											
Les deux sexes	36 400	100	10	8,7	12,0	89	87,1	90,5	x	x	x
Hommes	17 070	100	8	6,3	10,7	91	88,3	92,9	x	x	x
Femmes	19 330	100	12	9,8	14,7	87	84,3	89,5	x	x	x
Alberta											
Les deux sexes	73 100	100	14	12,6	16,4	85	82,8	86,8	F	F	F
Hommes	33 950	100	12	10,1	15,0	87	84,2	89,2	x	x	x
Femmes	39 150	100	16	13,6	19,3	83	80,0	85,8	x	x	x
Colombie-Britannique											
Les deux sexes	51 590	100	12	10,2	14,3	88	85,3	89,4	x	x	x
Hommes	23 200	100	10	7,8	13,7	89	85,8	91,8	x	x	x
Femmes	28 390	100	13	10,8	16,6	86	83,0	88,8	x	x	x
Territoires											
Les deux sexes	3 680	100	14^E	10,0	19,8	85	79,6	89,3	x	x	x
Hommes	1 800	100	10 ^E	6,3	16,2	89	82,9	92,9	x	x	x
Femmes	1 880	100	18 ^E	11,3	27,3	82	72,2	88,3	x	x	x

Nota :

La région de l'Atlantique inclut Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.

Les territoires incluent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

Les données sont basées sur la question suivante : « Les prochaines questions portent sur des problèmes de santé prolongés que vous pouvez éprouver à présent. Des problèmes de santé prolongés sont des problèmes qui durent depuis 6 mois ou plus ou qui risquent de perdurer pendant 6 mois ou plus. Est-ce qu'un médecin, une infirmière ou un autre professionnel de la santé a confirmé que vous souffriez de. »

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2006.

Tableau 3.5
Problèmes de santé chroniques : le diabète, adultes métis âgés de 15 ans et plus selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 2006

Région et sexe	Total		Oui			Non			Non déclaré		
	nombre	%	Intervalle de confiance à 95 %		%	Intervalle de confiance à 95 %		%	Intervalle de confiance à 95 %		
			de	à		de	à		de	à	
Canada											
Les deux sexes	340 440	100	7	6,1	7,4	93	92,0	93,4	1^E	0,4	0,8
Hommes	160 310	100	7	6,0	7,9	92	91,3	93,4	1 ^E	0,4	1,2
Femmes	180 130	100	7	5,8	7,6	93	92,0	93,8	0 ^E	0,2	0,7
Région de l'Atlantique											
Les deux sexes	17 980	100	6^E	4,0	7,9	94	92,1	96,0	x	x	x
Hommes	9 050	100	7 ^E	4,5	10,9	93	89,1	95,5	x	x	x
Femmes	8 930	100	4 ^E	2,5	7,1	96	92,9	97,5	x	x	x
Québec											
Les deux sexes	32 650	100	6^E	4,3	9,1	93	90,1	95,0	x	x	x
Hommes	14 930	100	F F		F	92	86,2	95,6	x	x	x
Femmes	17 720	100	6 ^E	3,9	8,5	94	90,8	95,7	x	x	x
Ontario											
Les deux sexes	70 820	100	7	5,6	9,1	92	90,4	93,9	x	x	x
Hommes	35 440	100	6 ^E	4,3	9,2	93	90,2	95,2	x	x	x
Femmes	35 380	100	8	5,8	10,9	92	88,7	93,8	x	x	x
Manitoba											
Les deux sexes	54 220	100	7	5,4	8,9	93	90,7	94,3	x	x	x
Hommes	24 870	100	6 ^E	4,3	8,8	93	90,0	95,1	x	x	x
Femmes	29 350	100	8	5,5	10,4	92	89,6	94,5	x	x	x
Saskatchewan											
Les deux sexes	36 400	100	8	6,8	10,0	91	89,0	92,4	F	F	F
Hommes	17 070	100	9	6,7	11,3	90	87,7	92,6	x	x	x
Femmes	19 330	100	8	5,8	10,4	91	88,4	93,4	x	x	x
Alberta											
Les deux sexes	73 100	100	6	4,9	7,3	93	92,0	94,6	x	x	x
Hommes	33 950	100	6	4,4	7,8	93	91,0	94,7	x	x	x
Femmes	39 150	100	6	4,6	8,0	94	91,6	95,2	x	x	x
Colombie-Britannique											
Les deux sexes	51 590	100	7	5,2	8,3	93	91,1	94,4	x	x	x
Hommes	23 200	100	8	6,0	11,4	91	88,1	93,7	x	x	x
Femmes	28 390	100	5 ^E	3,6	7,4	94	92,0	96,0	x	x	x
Territoires											
Les deux sexes	3 680	100	7^E	4,6	10,0	92	88,0	94,5	x	x	x
Hommes	1 800	100	7 ^E	3,9	10,9	91	84,3	94,5	x	x	x
Femmes	1 880	100	7 ^E	3,8	12,4	93	87,6	96,2	x	x	x

Nota :

La région de l'Atlantique inclut Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.

Les territoires incluent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

Les données sont basées sur la question suivante : « Les prochaines questions portent sur des problèmes de santé prolongés que vous pouvez éprouver à présent. Des problèmes de santé prolongés sont des problèmes qui durent depuis 6 mois ou plus ou qui risquent de perdurer pendant 6 mois ou plus. Est-ce qu'un médecin, une infirmière ou un autre professionnel de la santé a confirmé que vous souffriez de. »

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2006.

Tableau 4
Fréquence de la pratique des sports, y compris les leçons, enfants métis âgés de 6 à 14 ans, selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 2006

Région et sexe	Total		Moins d'une fois par semaine ou moins			1 à 3 fois par semaine			4 fois ou plus par semaine			Non déclaré		
	nombre	%	Intervalle de confiance à 95 %		Intervalle de confiance à 95 %		Intervalle de confiance à 95 %		Intervalle de confiance à 95 %		Intervalle de confiance à 95 %			
			%	de	à	%	de	à	%	de	à	%	de	à
Canada														
Les deux sexes	73 670	100	29	27,3	30,2	48	46,5	49,6	22	21,0	23,6	1 ^E	0,7	1,3
Garçons	36 940	100	26	24,6	28,4	45	43,0	47,3	28	25,8	29,5	1 ^E	0,5	1,4
Filles	36 730	100	31	29,0	33,1	51	48,8	53,2	17	15,2	18,8	1 ^E	0,7	1,7
Région de l'Atlantique														
Les deux sexes	3 190	100	33	27,2	38,4	44	38,5	49,7	23	18,3	28,0	x	x	x
Garçons	1 610	100	29	21,7	36,4	43	36,1	51,9	27	20,0	34,1	x	x	x
Filles	1 580	100	37	28,8	45,2	44	36,3	52,6	19 ^E	13,3	26,6	x	x	x
Québec														
Les deux sexes	4 880	100	26	21,6	31,1	51	44,9	56,4	22	17,8	27,7	x	x	x
Garçons	2 390	100	28	20,9	35,3	46	37,7	53,9	26	19,6	34,0	x	x	x
Filles	2 480	100	25	18,6	31,8	56	47,5	63,1	19 ^E	12,9	26,3	x	x	x
Ontario														
Les deux sexes	13 000	100	29	24,9	32,9	46	42,4	50,5	24	20,4	27,4	x	x	x
Garçons	6 150	100	29	23,5	35,0	42	36,1	47,7	28	23,4	33,6	x	x	x
Filles	6 850	100	29	23,4	34,4	51	44,8	56,3	20	15,2	25,1	x	x	x
Manitoba														
Les deux sexes	12 970	100	27	23,9	30,9	50	46,2	54,5	22	18,5	25,4	x	x	x
Garçons	6 660	100	24	19,5	28,5	47	41,2	52,5	29	24,1	34,3	x	x	x
Filles	6 310	100	31	25,7	36,8	54	47,9	60,1	14	10,5	19,1	x	x	x
Saskatchewan														
Les deux sexes	9 550	100	26	23,3	29,3	49	45,7	52,3	23	20,7	26,4	x	x	x
Garçons	5 010	100	25	21,4	29,3	46	41,7	50,6	28	24,1	32,3	x	x	x
Filles	4 540	100	27	23,1	31,9	52	47,2	57,0	19	14,8	22,7	x	x	x
Alberta														
Les deux sexes	16 700	100	31	28,0	33,9	46	43,1	49,3	22	19,2	24,3	1 ^E	0,7	2,5
Garçons	8 470	100	27	23,0	31,2	44	39,4	48,5	28	24,3	32,1	x	x	x
Filles	8 240	100	35	30,9	39,3	48	44,2	52,7	15	12,2	18,4	x	x	x
Colombie-Britannique														
Les deux sexes	12 450	100	30	26,4	33,2	50	45,7	53,3	21	18,0	23,8	x	x	x
Garçons	6 180	100	26	21,8	30,7	48	42,8	53,4	26	21,6	30,5	x	x	x
Filles	6 270	100	33	28,3	38,5	51	45,7	56,3	16	12,4	19,8	x	x	x
Territoires														
Les deux sexes	930	100	25	18,1	34,3	44	36,5	52,7	27	20,8	35,2	x	x	x
Garçons	470	100	32 ^E	21,1	43,7	40	30,0	52,9	23 ^E	16,5	34,0	x	x	x
Filles	460	100	F	F	F	48	36,5	59,6	30 ^E	21,2	42,3	x	x	x

Nota :

La région de l'Atlantique inclut Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.

Les territoires incluent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

Les données sont basées sur la question suivante : « Je vous lirai maintenant une liste d'activités. Veuillez m'indiquer la fréquence à laquelle il ou elle pratique chacune de ces activités. Comptez seulement le temps consacré à ces activités à l'extérieur des heures de classe. »

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2006.

Tableau 5.1
Adultes métis âgés de 15 ans et plus ayant un médecin de famille selon le sexe et l'âge, Canada, 2006

Âge et sexe	Total		Oui			Non			Non déclaré		
	nombre	%	Intervalle de confiance à 95 %			Intervalle de confiance à 95 %			Intervalle de confiance à 95 %		
			%	de	à	%	de	à	%	de	à
Les deux sexes	340 440	100	81	79,6	81,6	16	15,2	17,1	3	2,8	3,8
De 15 à 19 ans	43 800	100	83	80,2	85,4	15	12,6	17,8	2 ^E	1,4	2,9
De 20 à 24 ans	32 430	100	71	66,7	74,4	26	21,9	29,4	4 ^E	2,6	5,5
De 25 à 34 ans	64 710	100	76	73,0	78,3	20	17,6	22,5	4	3,2	5,7
De 35 à 44 ans	72 160	100	79	76,4	81,7	17	15,0	19,8	4 ^E	2,4	5,2
De 45 à 54 ans	66 110	100	85	82,3	86,8	13	11,3	15,4	2 ^E	1,4	3,2
De 55 à 64 ans	38 060	100	86	83,0	88,7	12	9,2	14,6	2 ^E	1,5	3,5
65 ans et plus	23 170	100	87	83,5	90,5	6 ^E	4,2	8,7	6 ^E	4,2	9,7
Hommes	160 310	100	77	74,9	78,2	20	18,9	22,0	3	2,5	3,8
De 15 à 19 ans	21 760	100	80	75,4	83,9	18	14,6	22,9	2 ^E	0,9	2,9
De 20 à 24 ans	14 080	100	64	57,4	69,6	32	26,7	38,5	4 ^E	2,3	6,8
De 25 à 34 ans	28 970	100	67	62,9	71,4	29	24,8	33,2	4 ^E	2,6	5,9
De 35 à 44 ans	32 770	100	73	68,6	77,0	23	19,2	27,2	4 ^E	2,6	6,2
De 45 à 54 ans	31 550	100	83	79,1	85,9	15	12,2	18,5	F	F	F
De 55 à 64 ans	19 850	100	84	79,6	87,5	14	10,4	17,8	2 ^E	1,3	4,3
65 ans et plus	11 330	100	89	85,0	92,7	7 ^E	4,4	11,1	4 ^E	1,9	6,4
Femmes	180 130	100	84	82,9	85,5	12	11,2	13,5	3	2,9	4,3
De 15 à 19 ans	22 040	100	86	82,5	88,8	12	9,1	15,0	2 ^E	1,5	3,7
De 20 à 24 ans	18 350	100	76	71,2	80,4	20	16,1	25,1	4 ^E	2,2	5,9
De 25 à 34 ans	35 730	100	83	79,2	85,7	13	10,1	15,9	5 ^E	3,1	6,8
De 35 à 44 ans	39 400	100	84	80,8	87,2	13	10,2	15,6	3 ^E	1,7	5,8
De 45 à 54 ans	34 560	100	86	83,2	89,1	11	9,0	14,5	2 ^E	1,3	3,4
De 55 à 64 ans	18 210	100	88	83,7	92,0	9 ^E	6,1	14,2	2 ^E	1,2	4,0
65 ans et plus	11 840	100	86	78,9	90,3	5 ^E	2,8	9,2	9 ^E	5,5	15,4

Nota :

La somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 % en raison de l'arrondissement des données.
 Les données sont basées sur la question suivante : « Avez-vous un médecin de famille? »

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2006.

Tableau 5.2
Adultes métis âgés de 15 ans et plus ayant un médecin de famille selon le sexe et l'âge, région de l'Atlantique, 2006

Âge et sexe	Total		Oui			Non			Non déclaré		
	nombre	%	Intervalle de confiance à 95 %		%	Intervalle de confiance à 95 %		%	Intervalle de confiance à 95 %		
			de	à		de	à		de	à	
Les deux sexes	17 980	100	80	76,4	82,6	13	10,5	16,0	7	5,9	9,0
De 15 à 19 ans	1 750	100	83	73,6	90,2	x	x	x	x	x	x
De 20 à 24 ans	1 580	100	66	50,0	79,7	F	F	F	11 ^E	6,0	19,9
De 25 à 34 ans	2 950	100	76	66,4	83,8	17 ^E	10,6	26,1	7 ^E	4,1	11,2
De 35 à 44 ans	3 720	100	75	66,2	82,2	16 ^E	10,1	24,2	9 ^E	5,4	14,6
De 45 à 54 ans	4 230	100	87	80,3	90,8	8 ^E	4,6	14,4	5 ^E	3,3	8,6
De 55 à 64 ans	2 410	100	88	77,5	94,4	x	x	x	x	x	x
65 ans et plus	1 350	100	74	58,2	85,2	x	x	x	12 ^E	6,1	21,3
Hommes	9 050	100	79	73,8	83,5	13	9,7	18,3	8^E	5,4	10,4
De 15 à 19 ans	1 020 ^E	100	86	72,3	93,9	x	x	x	x	x	x
De 20 à 24 ans	640 ^E	100	66	43,8	83,7	x	x	x	x	x	x
De 25 à 34 ans	1 150 ^E	100	81	65,1	89,8	x	x	x	x	x	x
De 35 à 44 ans	1 800	100	66	52,5	77,4	23 ^E	12,9	36,4	12 ^E	6,2	20,0
De 45 à 54 ans	2 380	100	90	83,3	94,0	x	x	x	6 ^E	3,5	11,0
De 55 à 64 ans	1 380 ^E	100	83	65,8	92,6	x	x	x	x	x	x
65 ans et plus	680 ^E	100	66 ^E	41,4	84,2	x	x	x	x	x	x
Femmes	8 930	100	80	75,4	84,5	13	9,1	17,1	7	5,1	9,8
De 15 à 19 ans	730 ^E	100	79	63,1	89,9	x	x	x	x	x	x
De 20 à 24 ans	950 ^E	100	66	43,8	83,4	x	x	x	x	x	x
De 25 à 34 ans	1 800	100	73	60,5	83,5	17 ^E	9,6	29,6	9 ^E	4,9	15,8
De 35 à 44 ans	1 910	100	84	72,5	90,7	x	x	x	x	x	x
De 45 à 54 ans	1 850	100	82	69,8	89,9	x	x	x	x	x	x
De 55 à 64 ans	1 020 ^E	100	96	82,4	99,0	x	x	x	x	x	x
65 ans et plus	680 ^E	100	81	64,9	91,7	X	x	x	x	x	x

Nota :

La région de l'Atlantique inclut Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick

La somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 % en raison de l'arrondissement des données.

Les données sont basées sur la question suivante : « Avez-vous un médecin de famille? »

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2006.

Tableau 5.3
Adultes métis âgés de 15 ans et plus ayant un médecin de famille selon le sexe et l'âge, Québec, 2006

Âge et sexe	Total		Oui			Non			Non déclaré		
	nombre	%	Intervalle de confiance à 95 %			Intervalle de confiance à 95 %			Intervalle de confiance à 95 %		
			%	de	à	%	de	à	%	de	à
Les deux sexes	32 650	100	72	67,3	76,0	24	20,4	28,6	4^E	2,8	5,5
De 15 à 19 ans	3 080 ^E	100	74	57,3	85,7	F	F	F	x	x	x
De 20 à 24 ans	1 940	100	58	41,8	73,0	37 ^E	22,1	53,8	x	x	x
De 25 à 34 ans	5 760	100	63	52,0	73,1	31 ^E	22,1	42,5	x	x	x
De 35 à 44 ans	6 620	100	67	56,0	75,9	29 ^E	19,8	39,2	x	x	x
De 45 à 54 ans	5 870	100	72	62,3	80,6	25 ^E	16,8	35,1	x	x	x
De 55 à 64 ans	6 140	100	79	66,7	87,6	18 ^E	10,1	31,1	x	x	x
65 ans et plus	3 240	100	90	81,8	94,0	x	x	x	x	x	x
Hommes	14 930	100	68	62,0	74,3	27	22,0	33,7	4^E	2,3	7,2
De 15 à 19 ans	1 520 ^E	100	F	F	F	F	F	F	x	x	x
De 20 à 24 ans	780 ^E	100	53 ^E	29,9	72,9	F	F	F	x	x	x
De 25 à 34 ans	2 880 ^E	100	56	38,8	71,1	40 ^E	24,9	56,9	x	x	x
De 35 à 44 ans	2 710	100	63	50,0	75,5	28 ^E	18,0	41,2	x	x	x
De 45 à 54 ans	2 710	100	69	57,9	78,7	30 ^E	20,7	41,5	x	x	x
De 55 à 64 ans	3 040	100	80	68,3	88,6	17 ^E	9,1	29,0	x	x	x
65 ans et plus	1 290 ^E	100	88	75,2	94,5	x	x	x	x	x	x
Femmes	17 720	100	75	68,3	80,2	22	16,2	28,0	4^E	2,5	5,5
De 15 à 19 ans	1 560 ^E	100	79	61,6	90,6	F	F	F	x	x	x
De 20 à 24 ans	1 160 ^E	100	63 ^E	41,3	80,0	x	x	x	x	x	x
De 25 à 34 ans	2 880	100	71	58,6	80,6	23 ^E	14,6	34,4	x	x	x
De 35 à 44 ans	3 910	100	69	53,3	81,0	29 ^E	16,9	44,6	x	x	x
De 45 à 54 ans	3 160	100	75	57,5	87,0	F	F	F	x	x	x
De 55 à 64 ans	3 100 ^E	100	78	55,0	90,8	x	x	x	x	x	x
65 ans et plus	1 950 ^E	100	90	79,0	95,9	x	x	x	x	x	x

Nota :

La somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 % en raison de l'arrondissement des données.

Les données sont basées sur la question suivante : « Avez-vous un médecin de famille? »

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2006.

Tableau 5.4
Adultes métis âgés de 15 ans et plus ayant un médecin de famille selon le sexe et l'âge, Ontario, 2006

Âge et sexe	Total		Oui			Non			Non déclaré		
	nombre	%	Intervalle de confiance à 95 %			Intervalle de confiance à 95 %			Intervalle de confiance à 95 %		
			%	de	à	%	de	à	%	de	à
Les deux sexes	70 820	100	86	82,9	87,8	12	9,9	14,3	3^E	1,5	4,3
De 15 à 19 ans	8 550	100	86	79,1	91,2	14 ^E	8,6	20,7	x	x	x
De 20 à 24 ans	6 260	100	85	76,1	91,5	13 ^E	7,5	22,8	x	x	x
De 25 à 34 ans	11 690	100	85	79,0	89,6	13 ^E	8,7	18,7	x	x	x
De 35 à 44 ans	15 840	100	85	77,6	90,6	11 ^E	6,6	16,8	x	x	x
De 45 à 54 ans	16 060	100	86	80,0	90,7	12 ^E	7,5	17,9	x	x	x
De 55 à 64 ans	8 190	100	86	78,9	91,0	14 ^E	9,0	21,1	x	x	x
65 ans et plus	4 230	100	83	68,1	91,9	x	x	x	x	x	x
Hommes	35 440	100	82	78,1	85,5	16	13,1	20,4	F	F	F
De 15 à 19 ans	4 530	100	84	72,8	90,7	16 ^E	9,0	26,8	x	x	x
De 20 à 24 ans	2 730	100	75	58,2	87,2	F	F	F	x	x	x
De 25 à 34 ans	4 700	100	76	63,4	84,5	23 ^E	14,2	34,7	x	x	x
De 35 à 44 ans	8 560	100	84	74,5	90,6	13 ^E	6,9	22,5	x	x	x
De 45 à 54 ans	8 200	100	86	76,6	92,0	14 ^E	7,8	23,2	x	x	x
De 55 à 64 ans	4 450	100	78	66,3	86,2	22 ^E	13,8	33,7	x	x	x
65 ans et plus	2 270 ^E	100	87	71,6	95,0	x	x	x	x	x	x
Femmes	35 380	100	89	85,2	91,8	7^E	5,3	10,3	F	F	F
De 15 à 19 ans	4 020	100	89	78,0	95,1	x	x	x	x	x	x
De 20 à 24 ans	3 530	100	93	84,0	97,2	x	x	x	x	x	x
De 25 à 34 ans	6 990	100	91	86,1	94,9	6 ^E	3,3	11,2	x	x	x
De 35 à 44 ans	7 280	100	87	73,2	93,8	F	F	F	x	x	x
De 45 à 54 ans	7 860	100	86	77,2	92,1	F	F	F	x	x	x
De 55 à 64 ans	3 740	100	96	90,1	98,3	x	x	x	x	x	x
65 ans et plus	1 970 ^E	100	78	50,9	92,5	x	x	x	x	x	x

Nota :

La somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 % en raison de l'arrondissement des données.

Les données sont basées sur la question suivante : « Avez-vous un médecin de famille? »

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2006.

Tableau 5.5
Adultes métis âgés de 15 ans et plus ayant un médecin de famille selon le sexe et l'âge, Manitoba, 2006

Âge et sexe	Total		Oui			Non			Non déclaré		
	nombre	%	Intervalle de confiance à 95 %		%	Intervalle de confiance à 95 %		%	Intervalle de confiance à 95 %		
			de	à		de	à		de	à	
Les deux sexes	54 220	100	80	77,3	83,0	16	13,6	18,7	4^E	2,5	5,7
De 15 à 19 ans	7 900	100	80	73,3	86,1	16 ^E	10,7	23,1	x	x	x
De 20 à 24 ans	4 730	100	62	50,2	73,2	34 ^E	23,8	46,8	x	x	x
De 25 à 34 ans	10 660	100	78	70,4	83,9	17 ^E	11,5	23,4	F	F	F
De 35 à 44 ans	10 750	100	77	69,1	84,0	19 ^E	12,9	26,6	x	x	x
De 45 à 54 ans	11 320	100	85	78,1	89,5	12 ^E	8,5	17,7	x	x	x
De 55 à 64 ans	5 100	100	87	78,3	92,7	11 ^E	6,1	20,0	x	x	x
65 ans et plus	3 750	100	95	82,0	98,7	x	x	x	x	x	x
Hommes	24 870	100	77	72,2	81,5	20	15,7	24,4	F	F	F
De 15 à 19 ans	3 620	100	78	66,8	85,8	19 ^E	11,5	29,5	x	x	x
De 20 à 24 ans	1 960 ^E	100	54 ^E	36,4	70,9	45 ^E	28,3	63,0	x	x	x
De 25 à 34 ans	4 930	100	75	64,4	83,2	22 ^E	14,1	32,8	x	x	x
De 35 à 44 ans	4 540	100	73	57,9	84,7	23 ^E	13,0	38,3	x	x	x
De 45 à 54 ans	5 130	100	78	65,6	86,1	17 ^E	10,1	26,1	x	x	x
De 55 à 64 ans	2 820 ^E	100	87	72,9	94,1	x	x	x	x	x	x
65 ans et plus	1 870 ^E	100	100	99,8	100,0	x	x	x	x	x	x
Femmes	29 350	100	83	79,2	86,0	13	10,1	16,1	4^E	2,6	6,9
De 15 à 19 ans	4 280	100	83	72,6	89,7	F	F	F	x	x	x
De 20 à 24 ans	2 770	100	68	52,2	80,8	27 ^E	15,0	43,0	x	x	x
De 25 à 34 ans	5 730	100	80	68,9	88,4	12 ^E	6,3	21,5	x	x	x
De 35 à 44 ans	6 220	100	80	71,1	87,1	16 ^E	9,7	24,2	x	x	x
De 45 à 54 ans	6 190	100	91	84,4	94,5	9 ^E	5,1	15,0	x	x	x
De 55 à 64 ans	2 290	100	87	74,5	94,3	x	x	x	x	x	x
65 ans et plus	1 880 ^E	100	90	68,0	97,5	x	x	x	x	x	x

Nota :

La somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 % en raison de l'arrondissement des données.

Les données sont basées sur la question suivante : « Avez-vous un médecin de famille? »

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2006.

Tableau 5.6
Adultes métis âgés de 15 ans et plus ayant un médecin de famille selon le sexe et l'âge, Saskatchewan, 2006

Âge et sexe	Total		Oui			Non			Non déclaré		
	nombre	%	Intervalle de confiance à 95 %		%	Intervalle de confiance à 95 %		%	Intervalle de confiance à 95 %		
			de	à		de	à		de	à	
Les deux sexes	36 400	100	79	76,8	81,5	18	15,5	19,8	3	2,3	4,4
De 15 à 19 ans	5 870	100	80	74,2	85,0	17	12,6	22,4	x	x	x
De 20 à 24 ans	4 220	100	68	60,3	75,5	29	22,1	36,8	x	x	x
De 25 à 34 ans	8 010	100	76	70,3	80,6	21	16,8	26,8	x	x	x
De 35 à 44 ans	6 760	100	76	69,9	81,5	17	12,9	23,3	6 ^E	3,8	10,3
De 45 à 54 ans	6 150	100	86	80,6	90,1	13 ^E	9,1	18,5	x	x	x
De 55 à 64 ans	3 140	100	90	83,2	94,7	9 ^E	4,9	16,1	x	x	x
65 ans et plus	2 250	100	85	74,9	91,7	X	X	X	x	x	x
Hommes	17 070	100	75	71,5	79,0	21	18,0	25,2	3^E	2,0	4,9
De 15 à 19 ans	2 920	100	81	72,8	87,6	16 ^E	10,5	24,9	x	x	x
De 20 à 24 ans	1 890	100	59	46,4	70,9	40	28,3	52,8	x	x	x
De 25 à 34 ans	3 680	100	67	58,0	74,2	31	23,3	39,2	x	x	x
De 35 à 44 ans	3 080	100	71	60,5	79,3	21 ^E	13,6	30,6	x	x	x
De 45 à 54 ans	2 610	100	83	74,0	89,7	15 ^E	9,0	24,6	x	x	x
De 55 à 64 ans	1 840	100	91	79,8	95,9	x	x	x	x	x	x
65 ans et plus	1 050 ^E	100	88	70,4	95,1	x	x	x	x	x	x
Femmes	19 330	100	83	79,6	85,4	14	11,7	17,0	3^E	2,0	5,0
De 15 à 19 ans	2 960	100	79	70,3	85,7	17 ^E	11,6	25,3	x	x	x
De 20 à 24 ans	2 320	100	76	65,5	83,7	20 ^E	12,8	29,5	x	x	x
De 25 à 34 ans	4 320	100	84	76,2	89,0	13 ^E	8,5	20,6	x	x	x
De 35 à 44 ans	3 680	100	81	72,9	86,8	15 ^E	9,5	22,1	x	x	x
De 45 à 54 ans	3 550	100	88	81,0	92,6	12 ^E	7,0	18,5	x	x	x
De 55 à 64 ans	1 300	100	91	78,9	95,7	x	x	x	x	x	x
65 ans et plus	1 190	100	83	68,1	92,2	x	x	x	x	x	x

Nota :

La somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 % en raison de l'arrondissement des données.

Les données sont basées sur la question suivante : « Avez-vous un médecin de famille? »

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2006.

Tableau 5.7
Adultes métis âgés de 15 ans et plus ayant un médecin de famille selon le sexe et l'âge, Alberta, 2006

Âge et sexe	Total		Oui			Non			Non déclaré		
	nombre	%	Intervalle de confiance à 95 %			Intervalle de confiance à 95 %			Intervalle de confiance à 95 %		
			%	de	à	%	de	à	%	de	à
Les deux sexes	73 100	100	79	76,9	81,3	18	16,0	20,2	3^E	2,0	4,0
De 15 à 19 ans	9 610	100	87	80,4	91,1	13 ^E	8,2	18,8	x	x	x
De 20 à 24 ans	8 030	100	68	59,7	74,9	28	21,0	35,4	x	x	x
De 25 à 34 ans	16 070	100	73	66,8	78,6	23	17,9	29,3	4 ^E	2,1	6,7
De 35 à 44 ans	16 420	100	77	71,3	81,5	21	16,4	26,0	x	x	x
De 45 à 54 ans	11 200	100	86	81,4	89,9	13	9,6	18,0	x	x	x
De 55 à 64 ans	7 380	100	87	79,5	91,8	9 ^E	5,3	16,5	x	x	x
65 ans et plus	4 390	100	85	76,0	90,5	x	x x		x	x	x
Hommes	33 950	100	72	68,2	75,6	25	21,8	29,0	3^E	1,6	4,5
De 15 à 19 ans	4 840	100	81	70,6	88,5	19 ^E	11,5	29,4	x	x	x
De 20 à 24 ans	3 770	100	62	50,7	72,8	32 ^E	22,6	43,6	x	x	x
De 25 à 34 ans	7 340	100	58	48,3	66,5	39	30,1	48,0	x	x	x
De 35 à 44 ans	6 870	100	64	54,7	71,6	33	25,7	42,5	x	x	x
De 45 à 54 ans	5 710	100	87	80,3	91,9	13 ^E	8,1	19,7	x	x	x
De 55 à 64 ans	3 320	100	86	71,1	93,6	x	x x		x	x	x
65 ans et plus	2 110	100	84	70,5	92,0	x	x x		x	x	x
Femmes	39 150	100	85	82,5	87,9	12	9,4	14,3	3^E	2,0	4,5
De 15 à 19 ans	4 770	100	92	85,2	96,0	x	x x		x	x	x
De 20 à 24 ans	4 260	100	73	61,2	81,5	24 ^E	15,3	34,7	x	x	x
De 25 à 34 ans	8 730	100	86	77,9	91,6	F	F F		x	x	x
De 35 à 44 ans	9 560	100	86	79,2	91,2	12 ^E	7,3	18,0	x	x	x
De 45 à 54 ans	5 490	100	85	77,6	90,4	14 ^E	8,6	21,1	x	x	x
De 55 à 64 ans	4 060	100	88	79,6	92,9	9 ^E	5,0	17,1	x	x	x
65 ans et plus	2 270	100	85	72,3	92,8	x	x x		x	x	x

Nota :

La somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 % en raison de l'arrondissement des données.

Les données sont basées sur la question suivante : « Avez-vous un médecin de famille? »

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2006.

Tableau 5.8
Adultes métis âgés de 15 ans et plus ayant un médecin de famille selon le sexe et l'âge, Colombie-Britannique, 2006

Âge et sexe	Total		Oui			Non			Non déclaré		
	nombre	%	Intervalle de confiance à 95 %		%	Intervalle de confiance à 95 %		%	Intervalle de confiance à 95 %		
			de	à		de	à		de	à	
Les deux sexes	51 590	100	85	82,2	87,5	12	9,9	14,9	3^E	1,9	4,2
De 15 à 19 ans	6 440	100	86	77,7	91,5	12 ^E	6,9	20,4	x	x	x
De 20 à 24 ans	5 180	100	78	66,2	86,0	18 ^E	10,6	29,7	x	x	x
De 25 à 34 ans	8 960	100	75	66,6	82,5	18 ^E	11,8	26,4	F	F	F
De 35 à 44 ans	11 300	100	87	81,3	91,8	12 ^E	8,0	18,5	x	x	x
De 45 à 54 ans	10 650	100	88	82,0	91,6	10 ^E	6,8	15,8	x	x	x
De 55 à 64 ans	5 340	100	91	84,6	95,1	x	x	x	x	x	x
65 ans et plus	3 720	100	94	81,3	98,1	x	x	x	x	x	x
Hommes	23 200	100	81	76,8	85,1	15	11,7	19,6	3^E	2,1	5,6
De 15 à 19 ans	3 090	100	80	65,9	89,2	x	x	x	x	x	x
De 20 à 24 ans	1 990 ^E	100	75	57,6	86,4	x	x	x	x	x	x
De 25 à 34 ans	4 000	100	74	61,4	83,1	18 ^E	9,6	29,9	x	x	x
De 35 à 44 ans	4 890	100	77	64,7	85,7	23 ^E	13,9	34,8	x	x	x
De 45 à 54 ans	4 490	100	83	73,0	90,1	14 ^E	7,7	24,0	x	x	x
De 55 à 64 ans	2 800	100	91	81,8	96,3	x	x	x	x	x	x
65 ans et plus	1 940	100	98	91,5	99,8	x	x	x	x	x	x
Femmes	28 390	100	88	84,3	91,1	10	6,9	13,2	F	F	F
De 15 à 19 ans	3 350	100	92	81,4	96,4	x	x	x	x	x	x
De 20 à 24 ans	3 180	100	80	64,1	89,5	x	x	x	x	x	x
De 25 à 34 ans	4 970	100	77	63,7	86,2	18 ^E	10,2	30,8	x	x	x
De 35 à 44 ans	6 410	100	96	90,7	98,0	x	x	x	x	x	x
De 45 à 54 ans	6 160	100	91	83,5	95,0	x	x	x	x	x	x
De 55 à 64 ans	2 540	100	91	80,5	96,0	x	x	x	x	x	x
65 ans et plus	1 780 ^E	100	88	65,5	96,7	x	x	x	x	x	x

Nota :

La somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 % en raison de l'arrondissement des données.

Les données sont basées sur la question suivante : « Avez-vous un médecin de famille? »

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2006.

Tableau 5.9
Adultes métis âgés de 15 ans et plus ayant un médecin de famille selon le sexe et l'âge, territoires, 2006

Âge et sexe	Total		Oui			Non			Non déclaré		
	nombre	%	Intervalle de confiance à 95 %			Intervalle de confiance à 95 %			Intervalle de confiance à 95 %		
			%	de	à	%	de	à	%	de	à
Les deux sexes	3 680	100	54	47,4	59,4	45	38,7	50,7	x	x	x
De 15 à 19 ans	590 ^E	100	51 ^E	34,6	67,2	46 ^E	29,8	62,2	x	x	x
De 20 à 24 ans	490 ^E	100	F	F	F	71	53,6	84,6	x	x	x
De 25 à 34 ans	610	100	54	39,6	67,9	44 ^E	30,7	59,2	x	x	x
De 35 à 44 ans	750	100	60	46,1	71,9	40 ^E	27,1	52,9	x	x	x
De 45 à 54 ans	620	100	63	49,4	74,6	35 ^E	23,9	49,0	x	x	x
De 55 à 64 ans	370	100	54	38,4	69,1	46 ^E	30,9	61,6	x	x	x
65 ans et plus	250 ^E	100	72	51,1	88,8	x	x	x	x	x	x
Hommes	1 800	100	48	39,7	55,7	49	40,8	56,8	x	x	x
De 15 à 19 ans	220 ^E	100	55 ^E	31,7	75,3	x	x	x	x	x	x
De 20 à 24 ans	320 ^E	100	x	x	x	72	51,1	86,9	x	x	x
De 25 à 34 ans	290 ^E	100	x	x	x	66	44,7	82,0	x	x	x
De 35 à 44 ans	320 ^E	100	59	40,9	73,4	44 ^E	26,6	59,1	x	x	x
De 45 à 54 ans	320 ^E	100	59	41,6	76,5	38 ^E	20,7	55,6	x	x	x
De 55 à 64 ans	210 ^E	100	52 ^E	29,4	71,1	x	x	x	x	x	x
65 ans et plus	120 ^E	100	F	F	F	x	x	x	x	x	x
Femmes	1 880	100	59	50,4	67,1	41	32,6	49,2	x	x	x
De 15 à 19 ans	370 ^E	100	F	F	F	51 ^E	29,6	72,0	x	x	x
De 20 à 24 ans	180 ^E	100	x	x	x	F	F	F	x	x	x
De 25 à 34 ans	320 ^E	100	75	57,5	86,5	25 ^E	13,5	42,5	x	x	x
De 35 à 44 ans	430 ^E	100	60	41,0	77,8	F	F	F	x	x	x
De 45 à 54 ans	300 ^E	100	63	47,9	79,7	33 ^E	20,3	52,1	x	x	x
De 55 à 64 ans	160 ^E	100	56 ^E	37,4	77,9	x	x	x	x	x	x
65 ans et plus	F	100	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Nota :

Les territoires incluent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

La somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 % en raison de l'arrondissement des données.

Les données sont basées sur la question suivante : « Avez-vous un médecin de famille? »

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2006.

Tableau 6
Contact avec un pédiatre, un omnipraticien ou un médecin de famille au cours des 12 derniers mois, enfants métis âgés de 6 à 14 ans, selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 2006

Région et sexe	Total		Oui			Non			Non déclaré		
	nombre	%	Intervalle de confiance à 95 %			Intervalle de confiance à 95 %			Intervalle de confiance à 95 %		
			%	de	à	%	de	à	%	de	à
Canada											
Les deux sexes	73 670	100	54	52,1	55,1	46	44,5	47,5	0 ^E	0,3	0,6
Garçons	36 940	100	56	53,7	58,2	44	41,4	45,9	0 ^E	0,2	0,8
Filles	36 730	100	51	49,1	53,5	48	46,1	50,5	F	F	F
Région de l'Atlantique											
Les deux sexes	3 190	100	45	39,6	51,4	55	48,6	60,4	x	x	x
Garçons	1 610	100	46	37,7	54,5	54	45,5	62,3	x	x	x
Filles	1 580	100	45	37,0	52,9	55	47,1	63,0	x	x	x
Québec											
Les deux sexes	4 880	100	50	44,2	55,5	50	44,5	55,8	x	x	x
Garçons	2 390	100	50	41,2	57,9	51	42,1	58,8	x	x	x
Filles	2 480	100	50	42,1	58,1	50	41,9	57,9	x	x	x
Ontario											
Les deux sexes	13 000	100	57	52,5	61,2	43	38,7	47,4	x	x	x
Garçons	6 150	100	59	53,0	65,1	41	34,9	47,0	x	x	x
Filles	6 850	100	55	48,9	60,8	45	39,1	51,0	x	x	x
Manitoba											
Les deux sexes	12 970	100	58	53,5	61,5	42	38,3	46,4	x	x	x
Garçons	6 660	100	63	57,3	68,0	37	31,8	42,5	x	x	x
Filles	6 310	100	52	45,8	58,1	48	41,7	54,0	x	x	x
Saskatchewan											
Les deux sexes	9 550	100	50	46,4	53,1	50	46,6	53,3	x	x	x
Garçons	5 010	100	50	45,4	54,8	50	44,9	54,1	x	x	x
Filles	4 540	100	49	44,3	54,4	50	45,3	55,5	x	x	x
Alberta											
Les deux sexes	16 700	100	53	50,2	56,6	46	42,6	48,9	x	x	x
Garçons	8 470	100	57	51,9	61,1	43	38,1	47,2	x	x	x
Filles	8 240	100	50	45,7	54,5	49	44,6	53,4	x	x	x
Colombie-Britannique											
Les deux sexes	12 450	100	53	49,6	57,1	46	42,3	49,8	x	x	x
Garçons	6 180	100	55	49,2	60,0	45	39,5	50,2	x	x	x
Filles	6 270	100	52	46,7	57,5	47	41,9	52,6	x	x	x
Territoires											
Les deux sexes	930	100	46	39,5	54,5	52	44,3	59,1	x	x	x
Garçons	470	100	49	38,6	59,4	49	38,1	58,9	x	x	x
Filles	460	100	46	34,6	55,6	54	44,4	65,4	x	x	x

Nota :

La région de l'Atlantique inclut Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.

Les territoires incluent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

Les données sont basées sur la question suivante : « Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté ou eu une conversation téléphonique avec un pédiatre, un médecin généraliste ou un médecin de famille concernant la santé physique, émotionnelle ou mentale de _____ ? »

La somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 % en raison de l'arrondissement des données.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2006.

Tableau 7
Adultes métis âgés de 15 ans et plus n'ayant pas reçu de soins de santé quand ils en avaient besoin, selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 2006

Région et sexe	Total		Oui			Non			Non déclaré		
	nombre	%	Intervalle de confiance à 95 %		%	Intervalle de confiance à 95 %		%	Intervalle de confiance à 95 %		
			de	à		de	à		de	à	
Canada											
Les deux sexes	340 440	100	11	10,1	11,8	88	87,0	88,8	1	0,9	1,5
Hommes	160 310	100	9	8,2	10,5	89	88,0	90,5	1 ^E	1,0	2,1
Femmes	180 130	100	12	11,2	13,7	87	85,3	87,9	1 ^E	0,7	1,4
Région de l'Atlantique											
Les deux sexes	17 980	100	12	9,0	15,5	87	83,1	90,2	x	x	x
Hommes	9 050	100	12 ^E	8,5	16,6	87	81,9	90,7	x	x	x
Femmes	8 930	100	12 ^E	7,7	17,9	87	81,0	91,6	x	x	x
Québec											
Les deux sexes	32 650	100	12	9,3	16,2	87	82,8	89,8	F	F	F
Hommes	14 930	100	11 ^E	7,1	15,6	88	83,0	91,8	x	x	x
Femmes	17 720	100	14 ^E	9,4	19,6	85	79,7	89,9	x	x	x
Ontario											
Les deux sexes	70 820	100	12	10,0	14,4	87	84,8	89,3	x	x	x
Hommes	35 440	100	10	8,1	13,5	89	85,3	91,1	x	x	x
Femmes	35 380	100	14	10,5	17,4	86	82,1	89,0	x	x	x
Manitoba											
Les deux sexes	54 220	100	10	8,1	12,3	89	86,5	91,0	x	x	x
Hommes	24 870	100	7 ^E	4,9	10,7	91	87,6	94,2	x	x	x
Femmes	29 350	100	12	9,6	15,7	87	83,4	89,7	x	x	x
Saskatchewan											
Les deux sexes	36 400	100	10	8,3	11,8	88	85,7	89,8	2^E	1,4	3,6
Hommes	17 070	100	9	6,8	12,2	89	85,7	91,5	2 ^E	1,0	3,8
Femmes	19 330	100	11	8,4	13,1	87	84,0	89,5	F	F	F
Alberta											
Les deux sexes	73 100	100	10	8,4	11,5	89	87,2	90,5	1^E	0,7	2,0
Hommes	33 950	100	8	6,2	10,5	90	87,8	92,5	x	x	x
Femmes	39 150	100	11	9,4	13,8	88	85,3	89,8	x	x	x
Colombie-Britannique											
Les deux sexes	51 590	100	11	8,8	13,8	88	84,9	90,0	1^E	0,7	2,2
Hommes	23 200	100	9 ^E	6,0	13,4	89	84,7	92,4	x	x	x
Femmes	28 390	100	13	9,9	16,3	87	82,9	89,5	x	x	x
Territoires											
Les deux sexes	3 680	100	14	9,8	18,3	84	78,3	88,0	x	x	x
Hommes	1 800	100	14 ^E	9,6	20,1	83	76,1	88,6	x	x	x
Femmes	1 880	100	13 ^E	7,8	20,9	85	75,9	90,0	x	x	x

Nota :

La région de l'Atlantique inclut Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.

Les territoires incluent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

Les données sont basées sur la question suivante : « Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où vous aviez besoin de recevoir des soins de santé et n'en avez pas reçu? »

La somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 % en raison de l'arrondissement des données.

Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2006.