



Agence de la santé
publique du Canada

Public Health
Agency of Canada

LA TUBERCULOSE AU CANADA



2009

PRÉDIFFUSION

Canada

MISSION :

Promouvoir et protéger la santé des Canadiens grâce au leadership, aux partenariats, à l'innovation et aux interventions en matière de santé publique.

Agence de la santé publique du Canada

POUR COMMUNIQUER AVEC NOUS

Pour obtenir plus d'information, des exemplaires du présent rapport ou d'autres rapports, veuillez communiquer avec :

Lutte antituberculeuse
Division des infections acquises dans la collectivité
Centre de la lutte contre les maladies transmissibles et les infections
Direction générale de la prévention et du contrôle des maladies infectieuses
Agence de la santé publique du Canada
100 promenade Eglantine, Immeuble Santé Canada
I.A. 0603B, Pré Tunney
Ottawa (ON) K1A 0K9
Téléphone : (613) 941-0238
Télécopieur : (613) 946-3902
Courriel : TB_1@phac-aspc.gc.ca

La tuberculose au Canada 2009 – Prédifusion

Ce rapport est accessible sur Internet à l'adresse suivante
<http://www.phac-aspc.gc.ca/tbpc-latb/index-fra.php>

Also available in English under the title:
Tuberculosis in Canada 2009 – Pre-release

Le présent rapport a été préparé par :

Edward Ellis, MD, MPH, FRCPC
Gestionnaire
Lutte antituberculeuse

Victor Gallant, MA
Épidémiologiste int.
Lutte antituberculeuse

Derek Scholten, MS
Épidémiologiste principal
Lutte antituberculeuse

Kathryn Dawson
Agente de surveillance
Lutte antituberculeuse

Melissa Phypers, MSc, MPA
Épidémiologiste principale
Lutte antituberculeuse

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la ministre de la Santé

Cat. : HP37-5/1-2009F-PDF
ISBN : 978-1-100-96214-6

REMERCIEMENTS

Les auteurs tiennent à remercier les membres du Comité canadien de lutte antituberculeuse et les responsables des programmes provinciaux et territoriaux de lutte contre la tuberculose d'avoir contribué et participé au Système canadien de déclaration des cas de tuberculose.

LA TUBERCULOSE

AU CANADA

2009

PRÉDIFFUSION

INTRODUCTION

Pour faciliter la publication anticipée de *La tuberculose au Canada 2009*, les cinq tableaux suivants ont été extraits du Système canadien de déclaration des cas de tuberculose (SCDCT) pour l'année 2009. Les données contenues dans le présent rapport préalable représentent le nombre total de cas de tuberculose active signalés à l'Agence de la santé publique du Canada en date du 31 août 2010. Ces données devraient être considérées comme provisoires jusqu'à la publication du rapport complet *La tuberculose au Canada 2009*.

GRANDES LIGNES

Au cours des sept dernières années, au Canada, le nombre total de cas déclarés de tuberculose (TB) active est resté relativement stable (en moyenne 1 623 cas par année). En 2009, 1 599 nouveaux cas de tuberculose active et de retraitement ont été signalés au SCDCT, ce qui indique que le nombre de cas déclarés a diminué de 2,7 % par rapport à 2008. Le taux d'incidence global est passé de 4,9 pour 100 000 habitants à 4,7 pour 100 000 habitants.

Selon les rapports préliminaires, toutes les provinces et tous les territoires ont signalé au moins un cas de TB active en 2009. Toutes les provinces du Canada atlantique ont déclaré une augmentation du nombre de cas comparativement à l'année 2008. Dans l'Ouest canadien, l'Alberta et le Manitoba ont constaté une augmentation du nombre de cas déclarés en 2009 relativement à 2008. Les provinces restantes ainsi que les trois territoires sont demeurés stables ou ont observé une diminution du nombre de cas déclarés en 2009 relativement à 2008.

Les trois provinces les plus peuplées (la Colombie-Britannique, l'Ontario et le Québec), qui formaient ensemble 75 % de la population canadienne en 2009, comptaient 66 % de tous les cas déclarés. C'est au Nunavut que le taux était le plus élevé, soit 174,0 cas pour 100 000 habitants (tableau 1).

Le plus grand nombre de cas, soit 18 % de l'ensemble, a été signalé chez les personnes âgées de 25 à 34 ans. Toutefois, le taux d'incidence correspondant (6,4 pour 100 000) dans ce groupe d'âge a été surpassé par le taux par âge de 8,5 pour 100 000 enregistré chez les personnes âgées de plus de 74 ans (tableau 2).

En 2009, les personnes nées à l'étranger représentaient 63 % de tous les cas de TB déclarés au Canada. Les cas chez les non-Autochtones nés au Canada et chez les Autochtones nés au Canada ont respectivement représenté 15 % et 21 % de tous les cas déclarés (tableau 3). Cependant, le taux de TB chez les Autochtones nés au Canada demeure le plus élevé des trois groupes, car il dépasse de six fois le taux général dans la population canadienne (qui est de 4,7 pour 100 000).

La TB pulmonaire continue à être la localisation principale la plus souvent signalée, étant responsable de 68 % de tous les cas déclarés (tableau 4). En tout, 64 cas de primo-infection tuberculeuse ont été dénombrés, dont 59 % chez les Autochtones nés au Canada. En outre, 86 % des 195 cas de TB des ganglions lymphatiques périphériques ont été diagnostiqués chez des personnes nées à l'étranger (tableau 5).

Tableau 1

Nouveaux cas de tuberculose active et de retraitement signalés et taux d'incidence pour 100 000 – Canada et provinces/territoires : 1999-2009

Année du diagnostic	CANADA	Province/territoire										T.N.-O.	Yn	T.N.-O.	Nt	
		T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.					
1999	Cas	1 821	12	2	15	15	15	314	699	132	116	149	328	1	23	15
	Taux	6,0	2,3	1,5	1,6	2,0	2,0	4,3	6,1	11,6	11,4	5,0	8,2	3,2	56,6	55,9
2000	Cas	1 724	10	2	3	10	318	700	98	104	133	286	3	10	47	
	Taux	5,6	1,9	1,5	0,3	1,3	4,3	6,0	8,5	10,3	4,4	7,1	9,9	9,9	24,7	170,9
2001	Cas	1 773	19	3	8	10	261	699	115	114	116	380	0	8	40	
	Taux	5,7	3,6	2,2	0,9	1,3	3,5	5,9	10,0	11,4	3,8	9,3	0,0	0,0	19,6	142,2
2002	Cas	1 666	9	1	9	11	288	716	98	89	128	286	0	4	27	
	Taux	5,3	1,7	0,7	1,0	1,5	3,9	5,9	8,5	8,9	4,1	7,0	0,0	0,0	9,6	93,7
2003	Cas	1 631	7	3	6	12	257	693	127	91	110	305	1	12	7	
	Taux	5,2	1,3	2,2	0,6	1,6	3,4	5,7	10,9	9,1	3,5	7,4	3,2	3,2	28,2	23,9
2004	Cas	1 613	7	1	8	10	219	700	144	70	109	299	4	10	32	
	Taux	5,0	1,4	0,7	0,9	1,3	2,9	5,6	12,3	7,0	3,4	7,2	12,7	12,7	23,1	107,2
2005	Cas	1 641	9	1	7	6	255	643	114	139	146	265	3	8	45	
	Taux	5,1	1,7	0,7	0,7	0,8	3,4	5,1	9,7	14,0	4,4	6,3	9,4	9,4	18,4	148,4
2006	Cas	1 654	12	0	10	2	228	673	134	87	131	320	3	6	48	
	Taux	5,1	2,4	0,0	1,1	0,3	3,0	5,3	11,3	8,8	3,8	7,5	9,3	9,3	13,9	155,8
2007	Cas	1 578	7	0	7	5	229	683	103	106	112	277	3	15	31	
	Taux	4,8	1,4	0,0	0,7	0,7	3,0	5,3	8,6	10,6	3,2	6,4	9,2	9,2	34,4	99,1
2008	Cas	1 644	8	0	4	6	240	603	141	95	167	300	8	13	59	
	Taux	4,9	1,6	0,0	0,4	0,8	3,1	4,7	11,7	9,4	4,6	6,8	24,1	24,1	29,7	186,6
2009*	Cas	1 599	22	1	7	10	195	580	156	93	177	286	4	12	56	
	Taux	4,7	4,3	0,7	0,7	1,3	2,5	4,4	12,8	9,0	4,8	6,4	11,9	11,9	27,6	174,0

* Les cas et les taux pour 2009 sont provisoires jusqu'à la publication du rapport annuel *La tuberculose au Canada 2009*. Il est probable que ces chiffres changent.

Tableau 2

Nombre de nouveaux cas de tuberculose active et de retraitement signalés et taux d'incidence pour 100 000 par groupe d'âge – Canada : 1999-2009

Année du diagnostic	TOTAL	Groupe d'âge										Âge inconnu
		<1	1 – 4	5 – 14	15 – 24	25 – 34	35 – 44	45 – 54	55 – 64	65 – 74	75 +	
1999	Cas	32	55	61	205	340	253	193	173	244	265	0
	Taux	9,5	3,7	1,5	5,0	7,7	4,8	4,6	6,3	11,4	16,1	-
2000	Cas	17	50	44	207	316	279	208	160	204	239	0
	Taux	5,0	3,4	1,1	5,0	7,3	5,3	4,8	5,7	9,5	14,0	-
2001	Cas	11	33	70	180	325	289	207	183	219	256	0
	Taux	3,3	2,3	1,7	4,3	7,5	5,5	4,6	6,3	10,1	14,5	-
2002	Cas	11	43	45	211	314	264	202	161	199	216	0
	Taux	3,4	3,1	1,1	4,9	7,3	5,0	4,4	5,2	9,2	11,9	-
2003	Cas	7	34	41	198	332	277	207	154	178	203	0
	Taux	2,1	2,5	1,0	4,6	7,7	5,3	4,4	4,7	8,1	10,8	-
2004	Cas	6	33	45	198	324	272	198	167	177	193	0
	Taux	1,8	2,4	1,1	4,6	7,5	5,3	4,1	4,9	8,0	10,0	-
2005	Cas	10	38	71	254	279	278	212	143	168	188	0
	Taux	2,9	2,8	1,8	5,8	6,4	5,4	4,3	4,0	7,5	9,5	-
2006	Cas	10	46	51	261	253	287	201	158	168	219	0
	Taux	2,9	3,3	1,3	5,8	5,8	5,7	4,0	4,3	7,4	10,7	-
2007	Cas	12	33	53	200	255	285	210	160	152	218	0
	Taux	3,3	2,4	1,4	4,4	5,8	5,7	4,1	4,2	6,5	10,4	-
2008	Cas	8	30	52	205	297	280	232	164	172	204	0
	Taux	2,2	2,1	1,4	4,5	6,6	5,7	4,4	4,1	7,2	9,5	-
2009*	Cas	12	32	44	218	295	277	234	166	135	186	0
	Taux	3,2	2,2	1,2	4,8	6,4	5,8	4,4	4,0	5,4	8,5	-

* Les cas et les taux pour 2009 sont provisoires jusqu'à la publication du rapport annuel *La tuberculose au Canada 2009*. Il est probable que ces chiffres changent.

Tableau 3

Nouveaux cas de tuberculose active et cas de retraitement signalés selon l'origine – Canada et provinces/territoires : 2009

Lieu de naissance	CANADA	Province/territoire										Nord*	
		T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.		
Amérindiens	Cas	228	2	0	0	0	5	8	84	54	27	35	13
	Taux	27,4	17,1	0,0	0,0	6,3	4,4	69,9	47,4	23,2	23,4	57,7	
Indiens inscrits	Cas	223	2			5	7	84	54	26	32	13	
	Taux	26,8	5,8			6,7	3,8	61,1	39,8	23,5	24,5	48,8	
Indiens (inscrits) vivant dans une réserve	Cas	124	2			0	2	62	37	15	6	0	
	Taux		9,3			-	2,1	71,1	52,4	20,7	8,9	0,0	
Indiens (inscrits) vivant hors réserve	Cas	86	0			0	2	22	17	11	21	13	
	Taux		0			-	2,3	43,7	26,1	29,1	33,1	126,0	
Inconnu	Cas	13	0			5	3	0	0	0	5	0	
	Taux	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
Indiens non inscrits	Cas	5	0			0	1	0	0	1	3	0	
	Taux	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
Inuits	Cas	89	16	0	0	14	1	1	0	0	0	57	
	Taux	155,8	303,1	0,0	0,0	118,1	52,8	229,9	0,0	0,0	0,0	165,9	
Métis	Cas	25	1	0	0	0	0	0	16	6	2	0	
	Taux	7,3	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	11,5	4,0	0,0	
Total des Autochtones	Cas	342	19	0	0	19	9	85	70	33	37	70	
	Taux	27,8	81,2	0,0	0,0	17,4	3,7	45,4	35,3	19,9	18,5	112,7	
Non-Autochtones	Cas	237	3	1	6	45	65	27	8	19	57	0	
	Taux	1,0	0,6	0,8	0,7	0,9	0,7	3,2	1,0	0,7	2,0	0,0	
Total des personnes nées au Canada	Cas	579	22	1	6	64	74	112	78	52	94	70	
	Taux	2,2	4,4	0,8	0,7	0,9	0,8	10,9	8,1	1,7	3,1	69,3	
Afrique, prévalence du VIH élevée	Cas	78	0	0	0	14	40	5	2	13	4	0	
	Taux	34,1	0,0	0,0	0,0	39,0	35,5	63,6	54,0	41,2	12,1	0,0	

...suite

Tableau 3 suite

Nouveaux cas de tuberculose active et cas de retraitement signalés selon l'origine – Canada et provinces/territoires : 2009

Lieu de naissance	CANADA	Province/territoire										Nord*
		T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	
Cas	26	0	0	0	0	14	5	2	0	2	3	0
Taux	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	12,8	77,0	0,0	30,7	76,0	0,0
Cas	52	0	0	0	0	26	15	0	0	9	2	0
Taux	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	2,9	0,0	0,0	14,6	3,5	0,0
Cas	57	0	0	0	0	9	24	0	1	5	17	1
Taux	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	1,7	0,0	3,3	2,0	3,6	21,9
Cas	14	0	0	0	1	5	4	1	1	0	2	0
Taux	3,9	0,0	0,0	0,0	104,3	6,6	2,1	7,2	23,3	0,0	5,5	0,0
Cas	106	0	0	0	0	12	52	6	3	19	13	1
Taux	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	12,6	72,3	65,9	32,8	22,0	392,2
Cas	222	0	0	1	1	13	141	4	0	22	40	0
Taux	28,3	0,0	0,0	33,5	65,1	28,7	28,8	31,1	0,0	33,9	24,8	0,0
Cas	409	0	0	0	1	34	182	24	8	55	105	0
Taux	22,6	0,0	0,0	0,0	16,4	26,4	21,9	43,0	46,0	27,3	19,1	0,0
Cas	39	0	0	0	1	4	29	2	0	0	3	0
Taux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des personnes nées à l'étranger	1 003	0	0	1	4	131	492	44	15	125	189	2
Taux	13,3	0,0	0,0	1,6	10,4	12,2	12,3	22,2	21,5	17,7	13,7	24,4
Cas	17	0	0	0	0	0	14	0	0	0	3	0
Cas	1 599	22	1	7	10	195	580	156	93	177	286	72
Taux	4,7	4,3	0,7	0,7	1,3	2,5	4,4	12,8	9,0	4,8	6,4	65,9

NOTA : Si le dénominateur pour la population PT dans la cellule est inférieur à 40, les données provinciales/territoriales sont supprimées et présentées sous forme agrégée. Pour les provinces de l'Atlantique (Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard), les données de population pour le statut des Indiens inscrits dans la réserve et hors-réserve ne sont disponibles qu'en forme agrégée. Les taux indiqués pour ces groupes représentent toute la région de l'Atlantique.

* Nord : Inclut Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon.

** Les cas et les taux pour 2009 sont provisoires jusqu'à la publication du rapport annuel *La tuberculose au Canada 2009*. Il est probable que ces chiffres changent.

Tableau 4

Nouveaux cas de tuberculose active et de retraitement signalés et taux d'incidence pour 100 000 selon la localisation principale – Canada : 1999-2009

Localisation principale	Année du diagnostic											
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Respiratoire	Cas	154	99	121	88	79	94	106	91	64	59	64
	Taux	0,5	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Pulmonaire†	Cas	1 135	1 102	1 164	1 054	997	966	985	1 138	1 041	1 148	1 086
	Taux	3,7	3,6	3,8	3,4	3,2	3,0	3,1	3,5	3,2	3,4	3,2
Autre formes respiratoires‡	Cas	56	60	49	53	63	90	112	86	93	80	95
	Taux	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3
Non respiratoire	Cas	9	6	4	8	12	13	14	10	9	14	11
	Taux	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SNC	Cas	15	16	16	18	26	19	20	15	22	11	12
	Taux	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Ganglion lymphatiques périphériques	Cas	243	258	233	238	247	251	243	188	203	180	195
	Taux	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,6	0,5	0,6
Autres§	Cas	186	155	163	177	166	179	161	125	146	152	136
	Taux	0,6	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4
Inconnue	Cas	23	28	23	30	41	1	0	1	0	0	0
	Taux	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL **	Cas	1 821	1 724	1 773	1 666	1 631	1 613	1 641	1 654	1 578	1 644	1 599
	Taux	6,0	5,6	5,7	5,3	5,2	5,0	5,1	5,1	4,8	4,9	4,7

* La primo -infection tuberculeuse inclut la primo -infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire et la pleurésie tuberculeuse de la primo-infection tuberculeuse progressive (codes 010.0-010.9 de la CIM-9; A15.7 et A16.7 de la CIM-10).

† La tuberculose pulmonaire englobe la tuberculose du poumon et des voies aériennes de conduction, qui comprend la fibrose tuberculeuse du poumon, la bronchectasie tuberculeuse, la pneumonie tuberculeuse, le pneumothorax tuberculeux, la tuberculose trachéale ou bronchique isolée et la laryngite tuberculeuse (codes 011-011.9, 012.2, 012.3 de la CIM-9; codes A15.0-A15.3, A15.5, A15.9, A16.0-A16.2, A16.4, A16.9 de la CIM-10). Sont inclus dans les cas de tuberculose pulmonaire les cas, sans égard à la désignation de la localisation dans la CIM (sauf pour le diagnostic primaire) pour lesquels les résultats des frottis et des cultures (effectués à partir des expectorations, du liquide de lavage bronchique et du liquide de lavage gastrique) sont positifs.

‡ Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire : pleurésie tuberculeuse (non primaire), tuberculose des ganglions lymphatiques endothoraciques, du médiastin, du rhinopharynx, du nez (cloison) et des sinus de la face (codes 012.0, 012.1 et 012.8 de la CIM-9; codes A15.4, A15.6, A15.8, A16.3, A16.5, A16.8 de la CIM-10).

§ Autres : tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques, des os et des articulations, de l'appareil génito-urinaire, de la peau, de l'oeil, de l'oreille, du corps thyroïde, de la glande surrénale et de la rate.

** Les cas et les taux pour 2009 sont provisoires jusqu'à la publication du rapport annuel *La tuberculose au Canada 2009*. Il est probable que ces chiffres changent.

Tableau 5

Nouveaux cas de tuberculose active et de retraitement signalés selon le lieu de naissance et la localisation principale – Canada : 2009

	Lieu de naissance	Localisation principale									
		TOTAL	Respiratoire			Non respiratoire				Inconnue	
			Primo-infection*	Pulmonaire†	Autres formes respiratoires‡	Miliaire	SNC	Ganglions lymphatiques périphériques	Autres§		
Per-sonnes nées au Canada	Amérindiens	228	27	147	24	2	3	14	11	0	
	Indiens (inscrits)	223	26	144	23	2	3	14	11	0	
	Indiens (inscrits) vivant dans une réserve	124	21	73	14	0	1	8	7	0	
	Indiens (inscrits) vivant hors réserve	86	5	61	9	2	1	6	2	0	
	Inconnu	13	0	10	0	0	1	0	2	0	
	Indiens non inscrits	5	1	3	1	0	0	0	0	0	
	Métis	25	1	20	2	1	0	1	0	0	
	Inuits	89	10	77	1	1	0	0	0	0	
	Total des autochtones	342	38	244	27	4	3	15	11	0	
	Non-autochtones	237	19	161	18	2	2	12	23	0	
Total	579	57	405	45	6	5	27	34	0		
Per-sonnes nées à l'étranger (régions de l'OMS)	Afrique, prévalence du VIH élevée	78	0	50	2	1	1	15	9	0	
	Afrique, prévalence du VIH faible	26	0	18	0	0	0	5	3	0	
	Région des Amériques – pays de l'Amérique latine et des Antilles	52	1	36	1	0	0	8	6	0	
	Europe orientale	14	0	12	1	0	0	1	0	0	
	Économies de marché établies et Europe centrale	57	0	42	4	2	0	4	5	0	
	Méditerranée orientale	106	2	63	7	0	1	22	11	0	
	Asie du Sud-Est	222	2	139	13	1	0	45	22	0	
	Pacifique occidental	409	2	278	19	1	4	65	40	0	
	Région inconnue	39	0	29	2	0	1	3	4	0	
	Total	1 003	7	667	49	5	7	168	100	0	
Lieu de naissance inconnu	17	0	14	1	0	0	0	2	0		
TOTAL**	1 599	64	1 086	95	11	12	195	136	0		

* La primo-infection tuberculeuse inclut la primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire et la pleurésie tuberculeuse de la primo-infection tuberculeuse progressive (codes O10.0-010.9 de la CIM-9; A15.7 et A16.7 de la CIM-10).

† La tuberculose pulmonaire englobe la tuberculose du poumon et des voies aériennes de conduction, qui comprend la fibrose tuberculeuse du poumon, la bronchectasie tuberculeuse, la pneumonie tuberculeuse, le pneumothorax tuberculeux, la tuberculose trachéale ou bronchique isolée et la laryngite tuberculeuse (codes O11-011.9, O12.2, O12.3 de la CIM-9; codes A15.0-A15.3, A15.5, A15.9, A16.0-A16.2, A16.4, A16.9 de la CIM-10). Sont inclus dans les cas de tuberculose pulmonaire les cas, sans égard à la désignation de la localisation dans la CIM (sauf pour le diagnostic primaire) pour lesquels les résultats des frottis et des cultures (effectués à partir des expectorations, du liquide de lavage bronchique et du liquide de lavage gastrique) sont positifs.

‡ Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire : pleurésie tuberculeuse (non primaire), tuberculose des ganglions lymphatiques endothoraciques, du médiastin, du rhinopharynx, du nez (cloison) et des sinus de la face (codes O12.0, O12.1 et O12.8 de la CIM-9; codes A15.4, A15.6, A15.8, A16.3, A16.5 A16.8 de la CIM-10).

§ Autres : tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques, des os et des articulations, de l'appareil génito-urinaire, de la peau, de l'oeil, de l'oreille, du corps thyroïde, de la glande surrénale et de la rate.

** Les cas pour 2009 sont provisoires jusqu'à la publication du rapport annuel *La tuberculose au Canada 2009*. Il est probable que ces chiffres changent.