



AC DUBUC

GENERAL

Origin & Breeding: bred at the Agriculture and Agri Food Canada Research Station in Fredericton from the cross (BR 64633-2 x F59103) and selected at the AAC Research Station in La Pocatière. Released in 1998.

Year registered in Canada: 1998

Registration No.: 4780

Maturity: mid-season

BOTANICAL FEATURES

Plants: medium size, erect, leafy; stems not pigmented; wings prominent, waved single; nodes slightly swollen and slightly pigmented.

Leaves: medium green, open; midribs and petioles not pigmented.

Terminal leaflets: narrowly ovate; tip acuminate; base cordate and slightly asymmetrical; medium wavy margins.

Primary leaflets: three pairs; medium ovate; tip cuspidate; base cordate, slightly asymmetrical.

Flowers: few, medium size violet corolla, slightly prominent star; bright yellow anthers; flower buds and peduncles moderately pigmented.

Tubers: long, sometimes slightly curved; smooth buff skin; few shallow eyes, predominantly apical; non prominent eyebrows; white flesh.

Sprouts: spherical; blue-violet; base moderately pubescent; apex not pigmented, weakly pubescent.

AGRICULTURAL FEATURES

High yielding variety; well adapted to Québec climatic conditions; good storability; medium long dormancy period; high specific gravity.

Utilization: fair for boiling, good for chipping at harvest, very good for french frying and baking.

Chief Markets: french fries and fresh market.

REACTION TO DISEASES

No information available.

AC DUBUC

GÉNÉRALITÉS

Origine génétique: issue du croisement (BR 64633-2 x F59103) réalisé à la station de recherche d'Agriculture et agroalimentaire Canada de Fredericton et sélectionnée à la station de recherche de AAC de La Pocatière. Disponible depuis 1998.

Année d'enregistrement au Canada: 1998

No. d'enregistrement: 4780

Maturité: mi-saison

CARACTÉRISTIQUES BOTANIQUES

Plants: moyens, dressés, feuillus; tiges non pigmentées; ailes proéminentes, simples et sinuées; noeuds légèrement enflés et légèrement pigmentés.

Feuilles: vert moyen, ouvertes; nervures médianes et pétioles non pigmentés.

Folioles terminales: étroitement ovées; bout acuminé; base cordée et légèrement asymétrique; marges moyennement ondulées.

Folioles primaires: trois paires; moyennement ovées; bout cuspidé; base cordée, légèrement asymétrique.

Fleurs: peu nombreuses, corolle violette, de grandeur moyenne, étoile légèrement proéminente; anthères jaune clair; boutons floraux et pédoncules moyennement pigmentés.

Tubercules: longs, parfois légèrement courbés; peau lisse de couleur chamois; yeux superficiels, peu nombreux, surtout apicaux; arcades non proéminentes; chair blanche.

Germes: sphériques; bleu-violet; base moyennement pubescente; apex non pigmenté, peu pubescent.

CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES

Variété à rendement élevé; bien adaptée aux conditions climatiques du Québec; bonne conservation; repos végétatif moyennement long; densité élevée.

Utilisation: passable bouillie, bonne pour les croustilles à la récolte, très bonne pour les frites et la cuisson au four.

Marchés principaux: frites et marché frais.

RÉACTION AUX MALADIES

Information non disponible