

AC SAGUENOR

GENERAL

Origin & Breeding: bred at the Agriculture Canada Research Center from the cross (Hudson x F73008) in La Pocatière, Québec (Canada) in 1986.

Year licensed in Canada: 1998

Licence No.: 4779

Maturity: early to mid-season

BOTANICAL FEATURES

Plants: medium height, erect; thin stems moderately pigmented; wings weakly prominent, straight single; nodes moderately swollen, weakly pigmented.

Leaves: yellowish green, semi-open, pubescent; midribs and petioles weakly pigmented.

Terminal leaflets: medium ovate; tip cuspidate; base cordate and slightly asymmetrical; weakly wavy margins.

Primary leaflets: three pairs, large; medium ovate; tip cuspidate; base cordate and asymmetrical.

Flowers: medium-sized, very pale lavender corolla, moderately prominent star; yellow-orange anther; flower buds weakly pigmented; peduncle weakly pigmented.

Tubers: oval to oblong; smooth white skin; shallow eyes, few to intermediate in number, uniformly distributed; slightly prominent eyebrows; light yellow flesh.

Sprouts: ovoid; base reddish purple, moderately pigmented, not pubescent; apex very weakly pigmented, moderately pubescent.

AGRICULTURAL FEATURES

This variety gives very good yields early in the season and excellent mid-season yields; well adapted to Québec climatic conditions; good storability; medium dormancy period; medium specific gravity.

Utilization: good for boiling and baking.

Chief Market: fresh market.

REACTION TO DISEASES

No information available

AC SAGUENOR

GÉNÉRALITÉS

Origine génétique: issue du croisement (Hudson x F73008) réalisé à la Station de recherche d'Agriculture Canada à La Pocatière, Québec (Canada) en 1986.

Année d'homologation au Canada: 1998

No. d'homologation: 4779

Maturité: hâtive à mi-saison

CARACTÉRISTIQUES BOTANIQUES

Plants: moyens, dressés; tiges minces, moyennement pigmentées; ailes légèrement proéminentes, simples et droites; noeuds moyennement enflés, légèrement pigmentés.

Feuilles: vert jaunâtre, semi-ouvertes, pubescentes; nervures médianes et pétioles légèrement pigmentés.

Folioles terminales: moyennement ovées; bout cuspidé; base cordée et légèrement asymétrique; marges légèrement ondulées.

Folioles primaires: trois paires, grandes; moyennement ovées, bout cuspidé; base cordée et asymétrique.

Fleurs: corolle lavande très pâle, grandeur moyenne, étoile moyennement proéminente; anthère jaune-orange; boutons floraux légèrement pigmentés; pédoncule faiblement pigmenté.

Tubercules: ovales à oblongs; peau blanche et lisse; yeux superficiels, peu à moyennement nombreux, répartis uniformément; arcades légèrement proéminentes; chair jaune pâle.

Germes: ovoïdes; base pourpre rougeâtre, moyennement pigmentée, non pubescente; apex très faiblement pigmenté, moyennement pubescent.

CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES

Cette variété donne de très bon rendements en récolte hâtive et d'excellents rendements en récolte de mi-saison; bien adaptée aux conditions climatiques du Québec; bonne conservation; repos végétatif moyen; densité moyenne.

Utilisation: bonne bouillie et cuite au four.

Marché principal: marché frais.

RÉACTION AUX MALADIES

Information non disponible