



## EN VOL

### GENERAL

**Origin & Breeding:** bred and selected by Les Buissons Research Centre, MAPAQ, Les Buissons (Québec) from (F68123 x Simcoe), in 1987.

**Year registered in Canada:** 1999

**Registration No.:** 5014

**Maturity:** very early

### BOTANICAL FEATURES

**Plants:** medium height, semi erect; stems slightly pigmented; wings medium; nodes moderately swollen.

**Leaves:** medium green, half close, slightly pubescent on lower surface, no pigmentation on mid-rib and petiole.

**Terminal leaflets:** medium ovate, acuminate tip, asymmetrical and acute base; faintly wavy margins.

**Primary leaflets:** four pairs, elliptical, acuminate tip, truncate and asymmetrical base.

**Flowers:** low to medium profusion; buds strongly pigmented; medium size white corolla, green yellow anthers; peduncle very slightly pigmented.

**Tubers:** round to oval; white smooth skin; medium deep to shallow eyes; slightly prominent eyebrows; white flesh.

**Sprouts:** spherical; sprout base has weak pubescence and a strong red-violet pigmentation; sprout tip is half-open with medium blue-violet pigmentation and strong pubescence.

### AGRICULTURAL FEATURES

Very good early yielding variety; high percentage of large tubers, attractive appearance. Medium high dry matter content. Excellent storability; long dormancy period.

**Utilization:** rather firm flesh with few discolouration after cooking. Excellent boiling quality. Very attractive appearance as washed potato.

**Chief Markets:** early and fresh market.

### REACTION TO DISEASES

**Moderately susceptible:** verticillium wilt, rhizoctonia

**Susceptible:** late blight, common scab.

## EN VOL

### GÉNÉRALITÉS

**Origine génétique:** issue du croisement (F68123 x Simcoe) réalisé et sélectionné par le Centre de recherche Les Buissons, MAPAQ, Les Buissons (Québec), en 1987.

**Année d'enregistrement au Canada:** 1999

**No. d'enregistrement:** 5014

**Maturité:** très hâtive

### CARACTÉRISTIQUES BOTANIQUES

**Plants:** moyens, port semi-dressé; tiges légèrement pigmentées; ailes moyennes; noeuds moyennement enflés.

**Feuilles:** vert moyen, semi-fermées, pubescence légère sur la surface inférieure, nervure médiane et pétiole non pigmentés.

**Folioles terminales:** moyennement ovées; apex acuminé; base pointue et asymétrique, marges légèrement ondulées.

**Folioles primaires:** quatre paires, elliptiques; apex acuminé; base tronquée et asymétrique.

**Fleurs:** peu à moyennement nombreuses; bourgeons très pigmentés; corolle de grosseur moyenne, blanche; anthères jaune verdâtre; pédoncules très faiblement pigmentés.

**Tubercules:** ronds à ovales; peau lisse et blanche; yeux peu à moyennement profonds; arcades légèrement proéminentes; chair blanche.

**Germes:** sphériques; base faiblement pubescente avec une forte pigmentation rouge violacé; apex mi-ouvert, moyennement pigmenté de bleu violacé, très pubescent.

### CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES

Variété ayant un très bon rendement hâtif; pourcentage élevé de gros tubercules de belle apparence. Contenu en matière sèche moyen. Excellente aptitude à la conservation; longue période de dormance.

**Utilisation:** chair relativement ferme ayant peu de décoloration après cuisson. Excellente qualité pour la cuisson à l'eau. Très belle apparence comme pomme de terre lavée.

**Marchés principaux:** primeurs et marché frais.

### RÉACTION AUX MALADIES

**Modérément sensible:** flétrissure verticillienne, rhizoctonie

**Sensible :** mildiou, gale commune.