



## PRIMEVERE

### GENERAL

**Origin & Breeding:** bred from the cross (F85001 x W231) made and selected by the Les Buissons Research Center, MAPAQ, at Pointe-aux-Outardes, Quebec (Canada). Released in 2007.

**Year registered in Canada:** 2007

**Registration number:** 6361

**Maturity:** early

### BOTANICAL FEATURES

**Plants:** medium size, erect to semi-erect; stems not or very weakly pigmented; straight single wings; nodes not swollen and not pigmented.

**Leaves:** medium green, semi-open; midribs and petioles not pigmented.

Terminal leaflets: broadly ovate; tip acuminate; base cordate and symmetrical; weakly wavy margins.

Primary leaflets: four pairs; medium ovate; tip cuspidate; base lobed, moderately asymmetrical.

**Flowers:** rather numerous, large blue-violet corolla with very prominent star; bright yellow anthers; flower buds moderately to strongly pigmented; calices strongly pigmented; peduncles slightly pigmented; low berry production.

**Tubers:** long; flaky buff coloured skin; few shallow eyes, uniformly distributed; moderately prominent eyebrows; cream flesh.

**Sprouts:** conical; red-violet; base and tip weakly pubescent and weakly pigmented.

### AGRICULTURAL FEATURES

High yielding variety; early tuber set. Tubers of attractive appearance. Medium dormancy period. Medium specific gravity.

**Utilization:** excellent for boiling; very weak sloughing after boiling; no discolouration after cooking.

**Chief Market:** early fresh market.

### REACTION TO DISEASES

**Moderately susceptible:** common scab, rhizoctonia.

**Susceptible:** late blight

## PRIMEVÈRE

### GÉNÉRALITÉS

**Origine génétique :** issue du croisement (F85001 x W231) réalisé et sélectionné par le Centre de recherche Les Buissons, MAPAQ, à Pointe-aux-Outardes, Québec. Mise sur le marché en 2007.

**Année d'enregistrement au Canada :** 2007

**Numéro d'enregistrement :** 6361

**Maturité :** hâtive

### CARACTÉRISTIQUES BOTANIQUES

**Plants :** grandeur moyenne, dressés à semi-dressés; tiges non ou très faiblement pigmentées; ailes simples et droites; noeuds non enflés et non pigmentés.

**Feuilles :** vert moyen, semi-ouvertes; nervures médianes et pétioles non pigmentés.

Folioles terminales : largement ovées; sommet acuminé; base cordée et symétrique; marges faiblement ondulées.

Folioles primaires : quatre paires, moyennement ovées, sommet cuspidé; base lobée et moyennement asymétrique.

**Fleurs :** assez nombreuses, grande corolle bleu-violet avec une étoile très proéminente; anthères jaune clair; boutons floraux moyennement à très pigmentés; calices fortement pigmentés; pédoncules peu pigmentés; faible production de baies.

**Tubercules :** longs; peau squameuse de couleur chamois; yeux superficiels, peu nombreux, répartis uniformément; arcades moyennement proéminentes; chair crème.

**Germes :** coniques; rouge-violet; base et apex faiblement pubescents et faiblement pigmentés.

### CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES

Variété à rendement élevé; tubérisation hâtive. Tubercules de belle apparence. Repos végétatif moyen. Densité moyenne.

**Utilisation :** excellente pour la cuisson à l'eau; très faible délitescence après cuisson à l'eau; aucune décoloration après cuisson.

**Marché principal :** primeurs.

### RÉACTION AUX MALADIES

**Modérément sensible :** gale commune, rhizoctonie.

**Sensible :** mildiou.