



## DEMANDES À L'ÉTUDE

## ROSIER

### ROSIER (*Rosa*)

**Dénomination proposée:** 'Poulpah025'  
**Numéro de la demande:** 05-4942  
**Date de la demande:** 2005/06/03  
**Requérant:** Poulsen Roser A/S, Fredensborg (Danemark)  
**Mandataire au Canada:** Miller Thomson Pouliot, Montréal (Québec)  
**Sélectionneur:** Mogens N. & Pernille Olesen, Poulsen Roser A/S, Fredensborg (Danemark)

Note: Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption pourra être accordée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

**Variété de référence:** 'Poulhi012' (Jolanda Hit)

**Sommaire:** La fleur de 'Poulpah025' comporte un nombre très élevé de pétales, tandis que celle de 'Poulhi012' en comporte un nombre faible à moyen. Les sépales sont moyennement à fortement appendiculés chez 'Poulpah025', alors qu'ils sont faiblement appendiculés chez 'Poulhi012'. Le filet des étamines extérieures est blanc chez 'Poulpah025', tandis qu'il est jaune chez 'Poulhi012'.

#### Description:

**PLANTE :** de hauteur moyenne, moyenne à large, à port buissonnant.

**JEUNES RAMEAUX :** à pigmentation anthocyanique brun rougeâtre à violette d'intensité moyenne.

**AIGUILLONS :** concaves à très concaves du côté inférieur; aiguillons courts absents ou très peu nombreux; aiguillons longs peu nombreux.

**FEUILLES :** moyennes à grandes, vert moyen, à face supérieure faiblement luisante; folioles plates en coupe transversale, à marge faiblement ondulée.

**FOLIOLE TERMINALE :** moyenne à longue, de largeur moyenne, à base arrondie.

**FLORAISON :** intermédiaire à tardive, presque continue; nombre très faible de fleurs par rameau.

**PÉDICELLE :** portant de nombreux poils ou aiguillons.

**BOUTONS FLORAUX :** largement ovés en coupe longitudinale.

**FLEURS :** doubles, de diamètre moyen à grand, comportant un nombre très élevé de pétales, rondes lorsque vues de dessus, à dessus convexe-aplati et dessous plat lorsque vues de côté; parfum absent ou très faible; sépales moyennement à fortement appendiculés.

**PÉTALES :** de taille moyenne; face interne à centre et marge gris (RHS 157A-B); face externe à centre et marge gris (RHS 157B); tache basale absente sur les deux faces; marge fortement réfléchie, moyennement à fortement ondulée.

**ÉTAMINES EXTÉRIEURES :** à filet blanc.

**FRUIT :** petit à moyen, à réceptacle en forme d'entonnoir.

**Origine génétique:** 'Poulpah025' est issue d'un croisement contrôlé réalisé en 2001 à Fredensborg, au Danemark, entre un semis non identifié (parent femelle) et la variété 'Kormutric' (parent mâle). Les graines résultant de ce croisement ont été semées en décembre 2001; elles ont germé au cours de l'hiver et au début du printemps 2002. 'Poulpah025' a été sélectionnée au printemps 2002 parmi les semis obtenus. L'objectif du programme de sélection était de créer une variété distincte possédant les caractéristiques suivantes : port compact et vigoureux en l'absence de greffage, fleur presque blanche, aptitude à la culture en serre à l'année, résistance aux maladies habituelles des rosiers et fleurs se conservant très longtemps après la récolte.

**Épreuves et essais:** La description détaillée de 'Poulpah025' est fondée sur le rapport d'examen technique de l'UPOV, numéro de référence de l'OCVV 2004/2561. Les essais ont été réalisés en 2005 par le Bundessortenamt, à Hanovre, en Allemagne. Les couleurs ont été déterminées à l'aide du RHS Colour Chart de 2001.



Rosier: 'Poulpah025'

---

<b>Dénomination proposée:</b>	<b>'Poulpah033'</b>
<b>Numéro de la demande:</b>	05-4946
<b>Date de la demande:</b>	2005/06/03
<b>Requérant:</b>	Poulsen Roser A/S, Fredensborg (Danemark)
<b>Mandataire au Canada:</b>	Miller Thomson Pouliot, Montréal (Québec)
<b>Sélectionneur:</b>	Mogens N. & Pernille Olesen, Poulsen Roser A/S, Fredensborg (Danemark)

Note: Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption pourra être accordée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

**Variété de référence:** 'Korescal'

**Sommaire:** *La fleur de 'Poulpah033' a la forme d'une étoile lorsque vue du dessus, tandis que celle de 'Korescal' est ronde. Les sépales sont moyennement appendiculés chez 'Poulpah033', alors qu'ils sont faiblement appendiculés chez 'Korescal'. Chez 'Poulpah033', les pétales ont une tache basale petite à moyenne sur leur face externe, tandis que chez 'Korescal' la tache basale est très petite.*

**Description:**

PLANTE : très haute, moyenne à large, à port buissonnant étroit.

JEUNES RAMEAUX : à pigmentation anthocyanique bronze à brun rougeâtre de faible intensité.

AIGUILLONS : concaves du côté inférieur; aiguillons courts absents ou très peu nombreux; aiguillons longs peu nombreux à moyennement nombreux.

FEUILLES : moyennes à grandes, vert moyen, à face supérieure faiblement à moyennement luisante; folioles légèrement concaves en coupe transversale, à marge faiblement à moyennement ondulée.

FOLIOLE TERMINALE : moyenne à longue, de largeur moyenne, à base arrondie.

FLORAISON : hâtive, presque continue; nombre très faible de fleurs par rameau.

PÉDICELLE : portant un nombre moyen à élevé de poils ou d'aiguillons.

BOUTONS FLORAUX : largement ovés en coupe longitudinale.

FLEURS : doubles, faiblement parfumées, de grand à très grand diamètre, en forme d'étoile lorsque vues de dessus, à dessus convexe-aplati et dessous plat lorsque vues de côté; pétales en nombre faible à moyen; sépales moyennement appendiculés.

PÉTALES : moyens à grands; face interne à centre et marge rouge-violet (RHS N57A), avec une tache basale grise (RHS 157A) petite à moyenne; face externe à centre et marge rouge-violet (RHS N66A), avec une tache basale grise (RHS 157C) petite à moyenne; marge fortement réfléchie, moyennement ondulée.

ÉTAMINES EXTÉRIEURES : à filet rose.

FRUIT : de grosseur moyenne, à réceptacle en forme d'entonnoir.

**Origine génétique:** 'Poulpah033' est issue d'un croisement contrôlé réalisé en 2002 à Fredensborg, au Danemark, entre la variété 'Poulhi008' (parent femelle) et un semis non identifié (parent mâle). Les graines résultant de ce croisement ont été semées en décembre 2002; elles ont germé au cours de l'hiver et au début du printemps 2003. 'Poulpah033' a été sélectionnée au printemps 2003 parmi les semis obtenus. L'objectif du programme de sélection était de créer une variété distincte possédant les caractéristiques suivantes : port compact et vigoureux en l'absence de greffage, fleurs rose foncé, aptitude à la culture en serre à l'année, résistance aux maladies habituelles des rosiers et fleurs se conservant très longtemps après la récolte.

**Épreuves et essais:** La description détaillée de 'Poulpah033' est fondée sur le rapport d'examen technique de l'UPOV, numéro de référence de l'OCVV 2005/1563. Les essais ont été réalisés en 2006 par le Bundessortenamt, à Hanovre, en Allemagne. Les couleurs ont été déterminées à l'aide du RHS Colour Chart de 2001.



Rosier: 'Poulpah033'

---

<b>Dénomination proposée:</b>	<b>'Poulpar031'</b>
<b>Numéro de la demande:</b>	05-4947
<b>Date de la demande:</b>	2005/06/03
<b>Requérant:</b>	Poulsen Roser A/S, Fredensborg (Danemark)
<b>Mandataire au Canada:</b>	Miller Thomson Pouliot, Montréal (Québec)
<b>Sélectionneur:</b>	Mogens N. & Pernille Olesen, Poulsen Roser A/S, Fredensborg (Danemark)

Note: Le requérant a demandé d'être exempté de l'obligation d'accorder des licences, afin d'avoir le temps de procéder à la multiplication et à la distribution du matériel de reproduction de la variété. L'exemption pourra être accordée pour une période de deux ans à compter de la date de délivrance du certificat d'obtention.

**Variété de référence:** 'Jenzar'

**Sommaire:** *La face interne des pétales est d'un rouge plus clair chez 'Poulpar031' que chez 'Jenzar'. La face interne des pétales présente une tache basale blanche chez 'Poulpar031', alors qu'elle présente une tache basale jaune chez 'Jenzar'. La marge des pétales est faiblement réfléchie chez 'Poulpar031', alors qu'elle est fortement réfléchie chez 'Jenzar'.*

**Description:**

PLANTE : courte à moyenne, étroite à moyenne, à port buissonnant.

JEUNES RAMEAUX : à pigmentation anthocyanique brun rougeâtre d'intensité moyenne.

AIGUILLONS : très concaves du côté inférieur; aiguillons courts absents ou très peu nombreux; aiguillons longs peu nombreux.

FEUILLES : petites à moyennes, vert foncé, à face supérieure moyennement luisante; folioles plates en coupe transversale, à marge non ondulée ou très faiblement ondulée.

FOLIOLE TERMINALE : de longueur moyenne, étroite à moyenne, à base obtuse.

FLORAISON : presque continue; nombre très faible à faible de fleurs par rameau.

PÉDICELLE : portant un nombre faible à moyen de poils ou d'aiguillons.

BOUTONS FLORAUX : largement ovés en coupe longitudinale.

FLEURS : doubles, faiblement parfumées, de très petit à petit diamètre, comportant peu de pétales, irrégulièrement arrondies lorsque vues de dessus, à dessus plat et dessous convexe-aplati lorsque vues de côté; sépales moyennement appendiculés.

PÉTALES : petits à moyens; face interne à centre et marge rouge (RHS 40A à 41A), avec une tache basale blanche (RHS 155A) très petite à petite; face externe à centre rouge (RHS 45C) et à marge rouge (RHS 42A-43A), avec une petite tache basale blanche (RHS 155A); marge faiblement réfléchie, faiblement à moyennement ondulée.

ÉTAMINES EXTÉRIEURES : à filet jaune.

FRUIT : petit à moyen, à réceptacle en forme d'urne.

**Origine génétique:** 'Poulpar031' est issue d'un croisement contrôlé réalisé en 2001 à Fredensborg, au Danemark, entre deux semis non identifiés. Les graines résultant de ce croisement ont été semées en décembre 2001; elles ont germé au cours de l'hiver et au début du printemps 2002. 'Poulpar031' a été sélectionnée au printemps 2002 parmi les semis obtenus. L'objectif du programme de sélection était de créer une variété distincte possédant les caractéristiques suivantes : port compact et vigoureux en l'absence de greffage, production abondante de fleurs rouge-orange, aptitude à la culture en serre à l'année, résistance aux maladies habituelles des rosiers et fleurs se conservant très longtemps après la récolte.

**Épreuves et essais:** La description détaillée de 'Poulpar031' est fondée sur le rapport d'examen technique de l'UPOV, numéro de référence de l'OCVV 2004/2566. Les essais ont été réalisés en 2005 par le Bundessortenamt, à Hanovre, en Allemagne. Les couleurs ont été déterminées à l'aide du RHS Colour Chart de 2001.



Rosier: 'Poulpar031'

**Dénomination proposée:** 'Scrivjean'  
**Numéro de la demande:** 08-6439  
**Date de la demande:** 2008/09/30  
**Requérant:** Spring Meadow Nursery, Inc., Grand Haven, Michigan (États-Unis)  
**Mandataire au Canada:** BioFlora Inc., St. Thomas (Ontario)  
**Sélectionneur:** Leonard William Scrivens, Kidderminster (Royaume-Uni)

**Variété de référence:** 'Horcoherent' (Oso Easy Peachy Cream)

**Sommaire:** *La fleur de 'Scrivjean' comporte plus de pétales que celle de 'Horcoherent'. Le dessous de la fleur est convexe-aplati chez 'Scrivjean', alors qu'il est concave à plat chez 'Horcoherent'. La fleur de 'Scrivjean' dégage un parfum d'intensité moyenne, tandis que celle de 'Horcoherent' est inodore ou très faiblement parfumée. Les pétales sont rose-rouge clair avec du jaune clair à la base chez 'Scrivjean', tandis qu'ils sont orange à rose-orange avec du rose-orange surtout à la marge chez 'Horcoherent'.*

**Description:**

PLANTE : rosier arbustif, à port intermédiaire.  
 JEUNES RAMEAUX : faiblement anthocyanées.  
 AIGUILLONS : peu nombreux, principalement rougeâtres.

FEUILLES : vert moyen, à face supérieure fortement luisante, à marge faiblement ondulée; nouvelles feuilles anthocyanées.  
 FOLIOLE TERMINALE : moyennement elliptique à ovée, à base obtuse, à sommet acuminé.

POUSSES FLORIFÈRES : produisant peu de rameaux florifères par pousse et peu de fleurs par rameau florifère.  
 BOUTONS FLORAUX : moyennement ovés en coupe longitudinale.  
 FLEURS : demi-doubles, irrégulièrement arrondies, moyennement parfumées, du groupe de couleur mélange de jaune; centre jaune; dessus aplati; dessous convexe-aplati; sépales non appendiculés ou très faiblement appendiculés.

PÉTALES : obovés, non incisés ou très faiblement incisés, en densité moyenne; marge faiblement réfléchiée et faiblement ondulée.  
 FACE INTERNE : bicolore, principalement rose-rouge clair (RHS 38D) légèrement plus foncé (RHS 38C) à la marge lorsque la fleur est nouvellement ouverte, rose-rouge clair (RHS 36B-C) lavé de rose (RHS 38C) à la marge lorsque la fleur est complètement ouverte, jaune clair (RHS 4D) à la base; tache basale jaune clair (RHS 7C-D), petite.  
 FACE EXTERNE : principalement vert-jaune avec du rose-rouge clair (RHS 36B) à la marge.  
 ÉTAMINES EXTÉRIEURES : à filet principalement orange virant au jaune moyen.

**Origine génétique:** 'Scrivjean' est issue d'un croisement réalisé en juin 1995 in Kidderminster, en Angleterre, entre les variétés 'Noatraum' (parent femelle) et 'Shine On' (parent mâle). La sélection a été effectuée en juin 1996 selon les critères suivants : port, qualité du feuillage (luisant et attrayant), couleur et forme des fleurs, petit nombre d'aiguillons et résistance aux maladies. La multiplication a été réalisée pour la première fois en 1997, à Kidderminster, par greffage et bouturage.

**Épreuves et essais:** Les essais ont été réalisés au champ durant l'été 2009, à St. Thomas, en Ontario. Ils ont porté sur 8 sujets de la variété candidate et 8 sujets de la variété de référence, obtenus de plants racinés transplantés au champ en mai 2007. Les rosiers étaient espacés de 60 cm, et les rangs étaient espacés de 90 cm. Les observations et mesures ont été faites le 23 septembre 2009. Les couleurs ont été déterminées à l'aide du RHS Colour Chart de 2001.

**Tableau de comparaison pour 'Scrivjean'**

	'Scrivjean'	'Horcoherent**
<i>Hauteur de la plante pendant la seconde pousse (cm)</i>		
moyenne	43,6	29,5
écart-type	9,74	6,00
<i>Longueur de la feuille (cm)</i>		
moyenne	9,2	7,5
écart-type	0,91	0,79
<i>Largeur de la feuille (cm)</i>		
moyenne	5,2	4,2
écart-type	0,67	0,43
<i>Nombre de pétales</i>		
moyenne	17,7	12,6
écart-type	1,49	1,78
<i>Couleur de la face interne des pétales (RHS)</i>		
Principale - fleur nouvellement ouverte	38D avec du 38C à la marge	29B-C avec du 38A à la marge, devenant moins vif à la base
Principale - fleur complètement ouverte	36B-C lavé de rose (38C) à la marge	mélange de 29C et de 27A
secondaire	4D	33D
tache basale	7C-D	3B
<i>Couleur de la face externe des pétales (RHS)</i>		
principale	4C avec du 36B à la marge	10C
*variété de référence		



Rosier: 'Scrivjean' (gauche) avec la variété de référence 'Horcoherent' (droite)