



BABY BOOMER

GENERAL

Origin & Breeding: bred by Arie S. Heijboer from the cross (AH86-102 x "Berlikummer Geeltje x Eigenheimer") in Kloelinge, The Netherlands in 1992.

Year registered in Canada: 2010

Registration number: 6740

Maturity: late

BOTANICAL FEATURES

Plants: medium height, semi-erect; stems thin with no pigmentation; prominent straight single wings; nodes slightly swollen, not pigmented; very branching.

Leaves: olive green, semi-open; midribs and petioles not pigmented.

Terminal leaflets: narrowly ovate; tip acuminate; base truncate and asymmetrical; weakly wavy margins.

Primary leaflets: five pairs; narrowly ovate; tip acuminate; base truncate and symmetrical.

Secondary and tertiary leaflets: numerous.

Flowers: moderately numerous; medium size blue-violet corolla with prominent star; orange anthers; flower buds and peduncles not pigmented.

Tubers: oval; flaky buff skin; moderately deep eyes, evenly distributed; non prominent eyebrows; yellow flesh.

Sprouts: spherical; blue-violet; base weakly pubescent, strongly pigmented; tip strongly pubescent and strongly pigmented; open habit; long lateral shoots.

AGRICULTURAL FEATURES

Medium yielding variety. Moderately numerous tubers of attractive appearance and good washing quality. Good storage capability. High specific gravity.

Utilization: good boiled and baked.

Chief Markets: fresh market and specialty market.

REACTION TO DISEASES

Information not available

BABY BOOMER

GÉNÉRALITÉS

Origine génétique : issue du croisement (AH86-102 x "Berlikummer Geeltje x Eigenheimer") réalisé par Arie S. Heijboer à Kloelinge, aux Pays-Bas, en 1992.

Année d'enregistrement au Canada : 2010

Numéro d'enregistrement : 6740

Maturité : tardive

CARACTÉRISTIQUES BOTANIQUES

Plants : grandeur moyenne, semi-dressés; tiges minces et non pigmentées; ailes proéminentes, simples et droites; noeuds légèrement enflés, non pigmentés; très ramifiés.

Feuilles : vert olive, semi-ouvertes; nervures médianes et pétioles non pigmentés.

Folioles terminales : étroitement ovées; bout acuminé; base tronquée et asymétrique; marges faiblement ondulées.

Folioles primaires : cinq paires; étroitement ovées; bout acuminé; base tronquée et symétrique.

Folioles secondaires et tertiaires: nombreuses.

Fleurs : moyennement nombreuses; corolle bleu-violet de taille moyenne, étoile proéminente; anthères orange; boutons floraux et pédoncules non pigmentés.

Tubercules : ovales; peau squameuse de couleur chamois; yeux moyennement profonds, répartis uniformément; arcades non proéminentes; chair jaune.

Germes : sphériques; bleu-violet; base peu pubescente, très pigmentée; apex très pubescent et très pigmenté, port ouvert; longues pousses latérales.

CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES

Variété à rendement moyen. Tubercules moyennement nombreux de belle apparence et ayant une bonne aptitude au lavage. Bonne capacité d'entreposage. Densité élevée.

Utilisation : bonne bouillie et cuite au four.

Marchés principaux : marché frais et marché de spécialité.

RÉACTION AUX MALADIES

Information non disponible