



REBOND

GENERAL

Origin & Breeding: bred from the cross (QP86013.02 x W231) made by Centre de recherche Les Buissons inc., MAPAQ, at Pointe-aux-Outardes, Quebec (Canada) in 1992.

Year registered in Canada: 2007

Registration number: 6362

Maturity: mid-season

BOTANICAL FEATURES

Plants: medium tall, semi-erect; rather thick stems, not pigmented; prominent straight single wings; slightly swollen nodes.

Leaves: olive green, open silhouette; petiole not pigmented.

Terminal leaflets: medium ovate; tip acuminate; base cordate and asymmetrical; margins slightly wavy.

Primary leaflets: three pairs, narrowly ovate; tip acuminate; base obtuse, very slightly asymmetrical.

Flowers: very numerous, white small corolla with prominent star, bright yellow anther; calix, flower bud and peduncle very slightly pigmented; low berry production.

Tubers: flattened round tuber; flaky brown skin; few shallow eyes, evenly distributed; slightly prominent eyebrows; white flesh.

Sprouts: conical, red-violet, base and tip weakly pigmented and weakly pubescent; closed habit.

AGRICULTURAL FEATURES

Medium yielding variety. Good resistance to hollow heart; medium dry matter content; medium dormancy period.

Utilization: firm texture, excellent for boiling; none to trace sloughing after boiling; none to trace blackening after cooking.

Chief Market: fresh market.

REACTION TO DISEASES

Susceptible: late blight, common scab, rhizoctonia.

REBOND

GÉNÉRALITÉS

Origine génétique: issue du croisement (QP86013.02 x W231) réalisé par le Centre de recherche Les Buissons inc., MAPAQ, à Pointe-aux-Outardes, Québec (Canada) en 1992.

Année d'enregistrement au Canada : 2007

Numéro d'enregistrement : 6362

Maturité : mi-saison

CARACTÉRISTIQUES BOTANIQUES

Plants : moyens, semi-dressés; tiges assez épaisses, non pigmentées; ailes proéminentes, simples et droites; nœuds légèrement enflés.

Feuilles : vert olive, silhouette ouverte; pétiole non pigmenté.

Folioles terminales : moyennement ovées; sommet acuminé; base cordée et asymétrique; marge légèrement ondulée.

Folioles primaires : trois paires; étroitement ovées; sommet acuminé; base obtuse, très légèrement asymétrique.

Fleurs : très nombreuses, petite corolle blanche ayant une étoile proéminente; anthère jaune vif; calice, bouton floral et pédoncule très légèrement pigmentés; faible production de baies.

Tubercules : ronds et aplatis; peau brune et squameuse; yeux superficiels, peu nombreux, répartis uniformément; arcades légèrement proéminentes; chair blanche.

Germes : coniques, rouge-violet, base et apex légèrement pigmentés et légèrement pubescents; forme fermée.

CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES

Variété à rendement moyen. Bonne résistance au cœur creux; densité moyenne; repos végétatif moyen.

Utilisation : texture ferme, excellente bouillie; aucune ou trace de délitescence après cuisson à l'eau; aucun ou trace de noircissement après cuisson.

Marché principal : marché frais.

RÉACTION AUX MALADIES

Sensible : mildiou, gale commune, rhizoctonie.